



Fræ nr.	Heiti	Lýsing
0922	Acaena microphylla - Þyrnihnetulauf	Harðgerð, skriðul planta. Þrífst í léttum, vel framræstum jarðvegi. Þolir hálfskugga. Laufið dökkgrænt og aldinið rauðþyrnótt. Falleg þekjuplanta. Blómstrar bleiku í júlí – Ágúst
1019	Achlys triphylla - Vanillulauf	Fjölær. Hæð 40 cm. Blóm lítil hvít um mitt sumar. Ruðfjölublá ber að hausti. Þrífst best í rakaheldum jarðvegi en þolir þurrk nokkuð. Sól eða háfskuggi. Vanillu ilmur af laufinu.
0923	Aconitum lycoctonum ssp. neapolitanum - Gulhjálmur	Fjölær. Blómstrar fölgulum blómum í júlí-ágúst. Þrífst best í sól en þolir hálfskugga. Jarðvegur næringarríkur, rakaheldinn og vel framræstur. Allir hlutar plöntunnar eru EITRAÐIR
0009	Aconitum napellus - Venusvagn/Bláhjálmur	Fjölær jurtt - 60-150cm hár, upprétt, blóm fagurblá, hentar í beð, eitruð jurtt
1057	Aconitum vulparia Þórshjálmur	Fjölær. Hæð 80 -100cm á hæð. Blómstönglar svolítið greinóttir með löngum klösum af ljósgulum blómum, blómsæl planta sem blómgast í júlí - ágúst.
1059	Aconitum-Cammarun _ Fagurhjálmur	Fjölær, 80 - 150 cm á hæð. Þurfa kuldameðferð til þess að spíra, best er að fjölga með skiptingu, Fagurhjálmur blómstrar í ágúst líkt og venusvagn (Bicolor blómstrar tvílitum, bláum og hvítum blómum)
0924	Actaea erythrocarpa - Dísaþrúgur	
0010	Actaea neglecta - Nunnuprúgur, hvítur	Fjölær jurtt -50-60cm, upprétt, blóm smá og hvít í klasa, rauð ber, eitruð jurtt
0504	Actaea rubra - Nunnuprúgur	Fjölær jurtt - 50-70cm, blómstrar hvítum blómklösum á háum blómstönglum sem mynda svo rauð eitruð ber. Fær fallega haustlíti. Vill helst frjóa garðmold í sól eða hálfskugga.
0655	Actaea spicata - Munkaprúgur	Fjölær jurtt - 40-60cm, upprétt, hvít blóm, svört ber, eitruð jurtt
0011	Adenostyles alliariae - Fjallasveipur	Fjölær . Hæð 1m getur orðið hærri. Blóm rauðfjölublá í sveipi í júlí-ágúst. Þrífst í rakaheldum næringarríkum djúpum jarðvegi og sól eða hálfskugga. Mjög harðgerð og glæsileg planta sem þarf ekki að binda upp blómstönglar mjög sveigjanlegir.
1082	Adonis davidii -	
0859	Agave parryi	Best fyrir garðskála, en getur verið úti á sólríkum stað yfir sumarið. Þykkblöðungur frá Mexiko og SV-USA. Þolir þó vægt frost ef er ekki of blaut. Getur orðið ca 50-70cm há. Þarf sérstaklega gott frárennsli og mikla sól. Yfirborðssáð, spírar við birtu í stofuhita, en tekur oft 1-3mánuði og in geta spírað á mjög misjöfnum tímum. Þó eitt spíri eftir 4 vikur getur restin spírað eftir 4mánuði.
0790	Alchemilla alpina* - Ljónslappi*	Fjölær íslensk planta. Hæð 5-25 cm. Blóm gulgræn í júní. Þrífst í malarjarðvegi, steinahæð eða þurri mómold í sól. Rósaætt/Rosaceae
0925	Alchemilla faeroensis* - Maríuvöttur*	Blóm maríuvattar eru lík blómum ljónslappans, nema utan-bikarflíparnir eru lengri, oft um helmingi styttri og mjórri en utanbikarblöðin. Stofnblöðin eru á 3-12 sm löngum stilk, stilkurinn með aðlægum hárum. Bláðkan er fremur lítil, 3-7 sm breið, djúpskert, klofin niður til miðs eða meira, með reglulega tennta, ávala, oftast 7 flípa, öll þétt silfurhærð að neðan, en lítið hærð ofan. Stönglar og blómleggir eru þétthærðir.



0563	Allium aflatunense - Höfuðlaukur	Harðgerð laukplanta með mörg ljósfjólublá blóm í kúlu efst á blómstönglinum, sem er oft öðru hvoru megin við 1meter en eitthvað hærri eintök hafa einnig sést. Betri á sólríkum stað og skynsamlegt að skýla gegn vindi. Myndar stór blöð nokkru áður en blómstöngull birtist. Tekur nokkur ár að fá blómstrandi plöntu úr í.
0510	Allium cernuum - Hvolflaukur	Fjölær laukplanta. Myndar bjöllulaga blóm á löngum stilkum, oftast fjólublá eða bleik en einnig til hvít. 30-40cm háir, grannir stilkar. Vill sól og þurran, framræstan jarðveg.
0808	Allium cernuum var. nanum- Hvolflaukur hvítur/bleikur	Bjöllulaga hvít/ bleik blóm hangandi á bognum stilkum, 30-40 saman í sveip, í júní-júlí. Hæð 40-70 cm. Harðger. Þrífst best á sólríkum stað í næringarríkum og rökum jarðvegi. Hentar í steinhæðir.
0926	Allium cyanthophorum var. farreri - Bikarlaukur	Fjölær. Lágvaxinn og fíngerður. Blómin minna svolítið á blóm graslauks, en eru í einhliða sveip á bikarlauknum. Laufið er fíngert og minnr á gras. Hann er ágætlega harðgerður og þolir nokkurn skugga.
0656	Allium hollandicum - blómstrandi laukur	Íslenskt nafn ekki til. Algengur skrautblómstrandi laukur í görðum. Vinsælasta yrkið er líklega 'Purple Sensation'
0657	Allium monadelphum - Hæðalaukur	Asísk laukplanta. Blöð og blómstönglar eru rörlaga, oft í kringum 50cm hávaxin. Blómstrar á enda blómstöngla dökkrauðum blómum. Blöð og blóm æt.
0014	Allium narcissiflorum - Skrautlaukur	Lágvaxinn, 15-20 cm hár, myndar þéttan brúsk af mjóum striklaga blöðum. Blómin 5-8 saman í sveip á enda blómstöngla, bjöllulaga, ljósbleik, lútandi, blómstrar í júní-júlí. Rakaheldinn jarðveg, bjartan stað.
0505	Allium ochotense/victoriales - Eyjalaukur/Sigurlaukur	Laukjurt - um 20-30cm há, upprétt, rauðfjólublá lútandi blóm, blómgast á þriðja vori eftir sáningu
0015	Allium oleraceum * - Villilaukur *	Fjölær laukjurt - þroskar ekki - en æxlilaukum þarf að sá strax eftir söfnun áður en þeir þorna. Komið til í snöggu og deigu graslendi. Arfur frá prestaskóla Hróðólfs (Rúðólfs) biskups í Bæ í Borgarfirði á árunum 1030-1050
0749	Allium oreophilum - Rósalaukur	Fjölær laukplanta. Hæð 10-30 cm. Bleik blóm í júlí. Laufið sölnar að blómgun lokinni. Þrífst í sól og frjóum léttum framræstum jarðvegi. Harðgerður og auðræktaður. Laukætt/Alliaceae
0927	Allium zebdanense - Rökkurlaukur	Fjölær laukjurt. Blómstrar í júní hvítu með rauðri miðtaug. Blóm stór á stuttum stilkum, 10-11 saman í sveip sem er 3-5 cm í þvermál.
0466	Alnus tenuifolia - Blæelri	Stór runni eða lágvaxið tré með dökkgræn fremur stór blöð, egglega og óreglulega tennt. Þolir vel rakan jarðveg, þarf sólríkan vaxtarstað.
0522	Alnus viridis - Kjarrelri	Kjarrelri eða kjarrölur. Margstofna runni af birkiætt. Það er ljóselsk tegund og nær að 2 m á hæð. Undirtegund hans, sitkaölur (Alnus viridis ssp. sinuata), er notuð í skógrækt hérlendis. Harðgert yrki. Þarf sólríkan vaxtarstað. Vindpolið. Þrífst best í rýrum jarðvegi og þolir ekki mikla áburðargjöf. Hefur svepprót.
0523	Alnus viridis ssp. Crispa - Grænelri	Grænelri eða grænölur, margstofna runni af birkiætt. Ljóselsk tegund og nær að 2 m á hæð. Talið fyrirtaks garðrunni. Verður ekki hávaxinn, vex eins og blævængur, endurnýjar sig frá miðju og hægt að stýra umfangi með því að klippa ystu greinar af við stofn.
0928	Aloe aristat - Tannlilja	Inniblóm
0534	Androsace adfinis ssp. brigantiaca	Fjölær steinhæðajurt, 10-25cm, sígræn blaðhvíring, hvít blóm - þarf þurran sandmalar-jarðveg og skjól fyrir vetrarvætu



- Berglykill		
0856	Androsace carnea - Fjallaberglykill	Fjölær steinhæðajurt. Sígræn lágvaxinn þúfumyndandi planta um 10 cm á hæð. Blóm hvít að vori. Þrífst í grýttum vel framræstum jarðvegi og sól.
0929	Androsace carnea ssp. rosea - Fjallaberglykill	Fjölær steinhæðajurt. Blóm bleik að vori. Þrífst best á sólríkum vaxtarstað í vel framræstum jarðvegi. Myndar þéttar sígrænar þúfur, blómstrar mikið. Hentar vel í steinhæðir.
0637	Androsace chaixii-Frakkaberglykill	Berglyklar, Androsace, tilheyra maríulykilsætt, Primulaceae. Í ættkvíslinni eru um 100 tegundir sem allar eru háfjallaplöntur sem þrífast best í grýttum jarðvegi á sólríkum stað. Þetta er aðallega "heimskauta–alpa" ættkvísl með margar tegundir í Himalaja, fjöllum mið Asíu, Kákasus og suður og mið Evrópskum fjallakeðjum, sérstaklega í Ölpunum og Pýrenneafjöllum
0857	Androsace darvasica - Berglykill án ísl. heitis	Fjölær steinhæðajurt. Sígræn lágvaxinn þúfumyndandi planta. Blóm hvít að vori. Þrífst í grýttum vel framræstum jarðvegi og sól.
0018	Androsace hedraeantha - Balkanberglykill	Fjölær steinhæðajurt, 15cm, sígræn blaðhvirfing, rósbleik blóm - þarf þurran sandmalar-jarðveg og skjól fyrir vetrarvætu
0623	Androsace lactea - Snæberglykill	Snæberglykill er stórgerðari en aðrir berglyklar og alveg sæmilega harðgerður. Nokkuð áviss blómstrun. Eins og aðrir berglyklar fer hann best í steinhæð eða steinhleðslu. Verður 10-30 cm hár, blómgast fyrri hluta sumars hvítum eða kremhvítum blómum. Þiggur sólskin með þökkum.
0855	Androsace sarmentosa var. primuloides - Heiðaberglykill	Fjölær steinhæðajurt, 5-10 cm, sígrænar blaðhvirfingar. Myndar breiður/þúfur. Blóm bleik. Þrífst í frekar þurrum sendnum jarðvegi á sólríkum stað.
0930	Anemona multifida 'Rubra' - Mjólkursnotra 'Rubra'	Fjölær. Blóm dökkbleik í júní-júlí. Hæð allt að 30 cm. Þrífst best í næringarríkum og vel framræstum jarðvegi í sól en þolir vel hálfskugga.
0022	Anemone multifida - Mjólkursnotra	Fjölær jurt, 7-60cm há eftir aðstæðum, vex upp af jarðstöngli í svarðaryfirborði, blóm stór opin og hvít í hálfsvæip, þarf frjóan jarðveg í skógarjaðri eða beðkanti, jafnvel steinhæð
0023	Anemone narcissiflora - Sveipsnotra	Fjölær. Um 30-40 cm há planta með upprétta blómstöngla, dökkgræn og skipt. Blómin eru snjóhvít, stundum með bleikum blæ, mörg saman í sveipum sem eru einkenni tegundarinnar. Blómstrar í júní, harðgerð, sólríkan stað og rakaheldinn jarðveg.
0727	Anethum graveolens 'Dukat' - Dill 'Dukat'	Dill. 80 cm há. Matjurt
0026	Angelica archangelica * - Ætihvönn *	Tvíær eða einbær jurt - 60-150cm, Stórvaxin upprétt, blóm grængul í kúlulaga sveip, deyr eftir fyrsta þroska, sáir sér mikið út sé ekki gætt að
0029	Anthyllis vulneraria * - Gullkollur *	Fjölær en skammlíf jurt, 5-20cm, gisið, flatt vaxtarlag, gul ertublóm í dúskum, steinhæð eða utan í mel eða á mögru og gisnu graslendi -
0648	Aquilegia - Dúnvatnsberablendingur	Fjölær. Blóm móðurplöntu líkjast blómum Dúnvatnsbera. í sáð við 20°C. spírar á nokkrum vikum. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.



0649	Aquilegia - Fjallavatnsberablendingur	Fjölær. Hæð 60-70 cm. Blómgun júní-júlí. Blóm tvílit blá og hvít. Þrífst í rakaheldum vel framræstum léttum jarðvegi í sól eða hálfskugga. i sáð við lágt hitastig. Spírun getur tekið nokkurn tíma. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0448	Aquilegia chrysantha 'Yellow Star' - Sunnuvatnsberi	Fjölær. Hæð 60-70 cm. Blómgun júní-júlí. Blóm gul, langir sporar. Þrífst best í léttum frekar næringarríkum jarðvegi en vel framræstum í sól eða hálfskugga. i sáð við 20° C. Spírun tekur 2-4 vikur. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0436	Aquilegia coerulea 'Crimson Star' - Indiánavatnsberi 'Crimson Star'	Fjölær. Hæð 60-80 cm. Blómgun frá lok júní og fram í ágúst. Blóm tvílit rauð og hvít, langir sporar. Þrífst best í vel framræstri létttri rakaheldinni garðamold í sól eða hálfskugga. i sáð við 20° C. spírar yfirleitt nokkuð fljótt en getur tekið nokkra mánuði. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0440	Aquilegia coerulea 'Michael Stromminger' - Indiánavatnsberi 'Michael Stromminger'	Fjölær. Hæð 60-90 cm. Blómgun júní-júlí. Blómlitur blár. Þrífst í sól eða hálfskugga í venjulegri garðamold sem er vel framræst en rakaheldin. i sáð við lágt hitastig. Spírun getur tekið nokkra mánuði. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0449	Aquilegia coerulea 'Red Hobbit' - Indiánavatnsberi 'Red Hobbit'	Fjölær. Hæð allt að 45 cm. Blómgun frá miðjum júní og fram í ágúst. Blóm tvílit rauð og hvít, langir sporar. Þrífst best í vel framræstri garðamold í sól eða hálfskugga. i sáð við 20° C. spírar yfirleitt á 2-3 vikum en getur tekið lengri tíma. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0646	Aquilegia flabellata - Blævatnsberi	Fjölær. Hæð allt að 35 cm. Blómgun lok maí og framundir lok júní. Blóm tvílit blá og hvít. Þrífst í hálfskugga eða sól í frjóum, rökum jarðvegi en vel framræstum. Þolir illa flutning. Hentar í steinbeð og kanta. i sáð við 20° C. spírar yfirleitt á 2-6 vikum. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0647	Aquilegia formosa - Glóðarvatnsberi	Fjölær. Hæð allt að 95 cm. Blómgun lok maí og út júní. Blóm tvílit rauð og gul frekar smá, stuttir sporar. Þrífst best í sól eða hálfskugga í léttum vel framræstum jarðvegi. Hérlandis aðallega ræktaður í grasagörðum. i sáð við 15-20° C og hulið lauslega. Spírun s getur tekið nokkra mánuði. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0455	Aquilegia glandulosa - Stjörnuvatnsberi	Fjölær. Um 30-50 cm há tegund með lítil og fínleg blöð og upprétta beina blómstöngla. Blómin eru stór, tvílit blá og hvít, stundum aðeins lútandi, með stutta krókbogna spora. Blómstrar í júní. Þrífst í frekar rakaheldnum jarðvegi en vel framræstum í sól eða hálfskugga. i sáð við lágt hitastig. Spírun óregluleg og getur tekið nokkra mánuði. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og



		blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0459	Aquilegia jonesii - Klettavatnsberi	Fjölær. Hæð 10-20 cm. Blómgun júlí. Blómlitur blár. Þrífst best í sól og vel framræstum kalkríkum grýttum jarðvegi. Í sáð við lágt hitastig, er ekki hulið. Spírur óregluleg og getur tekið nokkra mánuði eða jafnvel ekki fyrr en að ári. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0850	Aquilegia karelinii - Melavatnsberi	Fjölær en oft skammlífur. Hæð 75 cm. Blóm purpura/fjólublá fyrri hluta sumars. Þrífst í sól og rakaheldum en vel framræstum jarðvegi. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0456	Aquilegia ottonis ssp. amaliae - Grikkjavatnsberi	Fjölær. Lágvaxinn, 20-30 cm hár, myndar blaðbreiðu af þéttum blöðum, blómstönglarnir standa upp úr breiðunni. Blómin eru lútandi, frekar stór, ljósblá í botninn og hvít með stutta krókbogna spora. Þrífst í frekar léttum rakaheldum jarðvegi en vel framræstum í sól eða hálfskugga. Í sáð við frekar lágt hitastig og hulið lítilega. Spírur getur tekið nokkrar vikur. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0461	Aquilegia vulgaris - Skógarvatnsberi mix	Fjölær. Hæð allt að 80 cm. Blómgun júní-júlí. Blandaðir blómlitir. Þrífst í sól eða hálfskugga í léttri garðamold rakaheldinni en vel framræstri. Í sáð við lágt hitastig. Spírur getur tekið nokkra mánuði. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0434	Aquilegia vulgaris 'Melton Rapids' - Skógarvatnsberi 'Melton Rapids'	Fjölær. Hæð 50-70 cm. Blómgun júní-júlí. Blómlitur blár/vínrauður. Þrífst best í vel framræstri léttri rakaheldinni garðamold í sól eða hálfskugga. Í sáð við lágt hitastig og hulið lauslega. Spírur getur tekið nokkra mánuði. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0645	Aquilegia vulgaris 'Tower light blue' - Skógarvatnsberi 'Tower light blue'	Fjölær. Hæð 60-80 cm. Blómgast snemma sumars. Blóm ljósblá eða fjólublá. Þrífst í sól eða hálfskugga í næringarríkum léttum jarðvegi. Spírur við lágt hitastig og getur tekið nokkurn tíma. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0438	Aquilegia vulgaris 'Tower White' - Skógarvatnsberi 'Tower White'	Fjölær. Hæð 60-75 cm. Blómgun júní-júlí. Blómlitur hvítur. Þrífst í sól eða hálfskugga í venjulegri garðamold sem er létt og vel framræst. Í sáð við lágt hitastig. Spírur getur tekið nokkra mánuði. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0439	Aquilegia vulgaris 'William'	Fjölær. Hæð 60-90 cm. Blómgun júní-júlí. Blóm tvílit dökk fjólublá/purpura og hvít. Þrífst best í léttri rakaheldinni garðamold



	Guinness/'Magpie' - Skógarvatnsberi 'William Guinness'/'Magpie'	vel framræstri í sól eða hálfskugga. í sáð við 20° C. spírar yfirleitt nokkuð fljótt en getur tekið nokkra mánuði. Samheiti <i>Aquilegia vulgaris</i> 'Magpie'. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0450	<i>Aquilegia vulgaris</i> 'Woodside Varigated' - Skógarvatnsberi 'Woodside Varigated'	Fjölær. Allt að 70 cm á hæð. Vatnsberi 'Woodside Varigated' er með ljósbleik fyllt blóm og tvílit lauf grænt og gult/hvítt. Þrífst best í venjulegri garðamold vel framræstri. í sáð við lágt hitastig. Spírun getur tekið nokkra mánuði. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0460	<i>Aquilegia</i> x hybr 'sweet rainbows' - Garðavatnsberi 'sweet rainbows'	Fjölær. Hæð allt að 80 cm. Blómgun júní-júlí. Blandaðir blómlitir. Þrífst í sól eða hálfskugga í léttari garðamold rakaheldinni en vel framræstri. í sáð við 15-20° C. spírar óreglulega getur tekið nokkra mánuði. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0452	<i>Aquilegia</i> x hybr. 'Music Harmony' - Garðavatnsberi 'Music Harmony'	Fjölær. Hæð 60-80 cm. Blómgun júní-júlí. Blandaðir blómlitir, langir sporar. Þrífst best í sól eða hálfskugga og venjulegri garðamold léttari rakaheldinni en vel framræstri. í sáð við 20° C. Spírun óregluleg allt að nokkrum mánuðum. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir.
0792	<i>Aquilegia</i> x hybrida - Garðavatnsberi, blandaðir litir	Fjölær. Hæð 60-80 cm. Blómgun júní-júlí. Blandaðir blómlitir. Þrífst best í sól eða hálfskugga og venjulegri garðamold léttari rakaheldinni en vel framræstri. í sáð við 20° C. Spírun óregluleg allt að nokkrum mánuðum. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir. Sóleyjaætt/Ranunculaceae. Plöntur af sóleyjaætt eru allar að einhverju leyti eittraðar en mis mikið.
0506	<i>Aquilegia</i> x hybrida red and yellow - Garðavatnsberi rauður og gulur	Fjölær. Hæð 50-80 cm. Blóm tvílit rauð og gul með langa spora í júlí-ágúst. Þrífst í léttari frjórrari garðamol rakaheldinni en vel framræstri í sól. í sáð við 20° C. spírar á nokkrum mánuðum. Vatnsberar eru almennt harðgerðir og blómviljugir en blómstra ekki á fyrsta ári. Vatnsberar geta sáð sér talsvert og sé þess ekki óskað er ráðlegt að klippa blómstöngla af að blómgun lokinni. Vatnsberi/Sporasóley frjóvgast með opinni frjóvgun og getur því víxlfrjóvgast við aðrar vatnsberategundir. Ranunculaceae/Sóleyjaætt. Plöntur af sóleyjaætt eru allar að einhverju leyti eittraðar en mis mikið.
1038	<i>Arabis arendsii</i> - Hjartasteinbroti	Lágvaxinn fjölæringur. Sáð inni 6-8 vikum fyrir útplöntun. Íð þarf birtu til að spíra og er því lítið hulið. Úðað yfir in. Haft við 20°C. Spírar eftir 15-25 daga.
0030	<i>Arabis soyeri</i> ssp.subcoriacea - Gljáskriðnablóm	Steinhæðajurt - 15-60cm, blaðhvirfingar, hvít, rauðfjóbla eða bleik blóm
0032	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> * -	Sígrænn, jarðlægur runni -10cm hár, breiðmyndandi, bleik klukkublóm og rauð ber. Þarf lyngmoldarjarðveg



Sortulyng *	(rhododendronmold) og smitun með rôtarsveppum bláberjaættkvíslarinnar eða villts sortulyngs.
0033 Armeria maritima * - Geldingahnappur *	Fjölær harðgerð íslensk planta. Hæð 10-20 cm. Bleik blómí júní, þrífst best í sendnum eða þurrum jarðvegi.
0809 Armeria maritima 'Leuceana Splendens' - Geldingahnappur 'Leuceana Splendens'	Blóm sterkrósrauð. Steinhæðajurt - 10-12 cm, blaðhvirfingar saman á langri stólparót, rósrauð blóm, þarf malarborinn jarðveg.
0034 Arnica alpina - Alpagullblóm	Fjölæringur 15-40cm hár af körfublómaætt. Blómstrar gulum/gylltum blómum síðsumars. Kýs léttan, þurran eða vel framræstan, súran jarðveg í hálfskugga.
0035 Arnica montana - Fjallagull	Fjölær jurt - 20-60cm, upprétt, sverðlaga blöð, gul körfublóm, beð eða gisið graslendi
1071 Aronia	Runni ættaður frá Taiwan sem verður um það bil 60-100 cm á hæð. Blóm hvít með rauðri/dökk bleikri miðju. Þrífst best í sól eða hálfskugga og venjulegri garðamold. Lítil reynsla.
0931 Arrhenatherum elatius ssp. Bulbosum - Hnúðhafri	Fjölær grastegund. Hæð um 80 cm. Þrífst í næringarríkum jarðvegi og sól.
0862 Aster chinensis - Sumarstjarna Tall Blue Pompon	Einær/sumarblóm. Forsáð inni við stofuhita, í lok febrúar/byrjun mars. Sáð mjög grunnt, ca 4-5mm. Áframræktað á svalari stað með nægri birtu. Að lokum vanið varlega við útiveruna eftir frosthættu. Getur náð 50-60cm hæð. Best í góðri sól.
0863 Aster chinensis 'Tall Paeony Duchess Yellow' - Sumarstjarna	Einær/sumarblóm. Forsáð inni við stofuhita, í lok febrúar/byrjun mars. Sáð mjög grunnt, ca 4-5mm. Áframræktað á svalari stað með nægri birtu. Að lokum vanið varlega við útiveruna eftir frosthættu. Getur náð 50-60cm hæð. Best í góðri sól.
0794 Astrantia carniolica rubra - Alpasveipstjarna, rauð	Fjölær. Hæð allt að 50 cm. Blómstrar rauðum blómum í júlí-ágúst. Kýs næringarríkan léttan rakaheldann en vel framræstann jarðveg í sól eða hálfskugga. Harðgerð. Sveipjurtaætt/Apiaceae
0037 Astrantia major 'Hadspen Blood' - Sveipstjarna 'Hadspen Blood'	Fjölæringur, harðger og blómviljugur. Blóm í júní - ágúst. Hæð 70-80 cm. Þrífst best í meðal frjóum jarðvegi, þolir hálfskugga en blómstrar þá seinna.
1070 Astrantia major rosea _ Sveipstjarna bleik	Hægvaxta tré sem ætti að geta náð a.m.k. 25 m hérlendis Einstofna, beinvaxið tré með fremur mjóa krónu, Frostþolin.
0038 Astrantia major 'Rubra' - Sveipstjarna, rauð	Fjölær jurt - 60-100cm, upprétt, rauðleit blóm í smásveipum, góð til afskurðar
0932 Astrantia major 'Ruby Wedding' - Sveipstjarna 'Ruby Wedding'	Fjölær. Hæð 60-70 cm. Blóm fjólurauð í júlí-ágúst. Þrífst í rakaheldum vel framræstum garðajarðvegi í sól eða hálfskugga.
0933 Aurinia saxatile (syn. Alyssum saxatile) 'Sulphureum' - Bergnál 'Sulphureum'	Fjölær. Hæð allt að 40 cm. Blóm gul til fölgul í júní-ágúst. Jarðvegur sendinn vel framræstur en rakaheldinn og meðal næringarríkur. Kýs sól.
0934 Aurinia saxatilis - Bergnál	Blómliður gulur. Blómstrar í maí - júní. Harðgerð. Þarf sólríkan vaxtarstað. Þrífst best í þurrum jarðvegi. Hentar í steinhæðir. Þolir illa umhleyppinga.



1080	Avenula pubescens - Dúnhafri	Fjölært strá, 10-35 cm á hæð.
1079	Azorella trifurcata - Nálarpúði	Tilheyrir ætt goðablóma, lítið vitað um reynslu af honum hérlendis.
0557	Berberis francisci-fernandi - Sveigbroddur	Þyrnóttur runni með fallegar bogsveigðar greinar. Oft nærri 2m að hæð. Blómstrar fölgulum blómum í klasa eða hálfsvæig í byrjun sumars. Kýs léttan og vel framræstan jarðveg í nokkurri sól. Á það til að kala nokkuð.
1041	Berberis thunbergi - Blóðbroddur	Blóðbroddur þyrnóttur skrautrunni. Þarf kaldörvun, hægt að sá og setja út og skýla yfir veturinn í vermireit eða geyma ið í sandi yfir veturinn. Plöntur af i geta verið ólíkar móðurplöntunni vegna erfðarblöndunar.
1039	Bergenia Cordifolia - Hjartasteinbroti	Algeng fjölær planta. ið þarf kaldörvun í 2 vikur, því er síðan dreift á raka sáðmold, haft við 20 °C og ekki hulið. Spírun getur tekið talsverðan tíma.
0374	Beta vulgaris - Rauðrófa	Rauðrófa eða rauðbeða er rôtargrænmeti, rautt á lit. Rauðrófa er náskyld sykurrófu og beðju. Hún er tvíær, fyrra árið myndast rôtarávöxtur en seinna árið myndast .
1036	Beta vulgaris 'Rhubarb Chard' -	
0045	Betula nana * - Fjalldrapi *	Lauffellandi runni - 20-60cm, gráleitur börkur - kjarrvöxtur, dafnar best í malarkenndum móajarðvegi, má ekki hylja - bara þrýsta niður í moldaryfirborð - halda röku og hafa í birtu meðan spírar
0048	Betula pubescens - Ilmbjörk	Lauffellandi tré - allt að 20m, oftast brúnleitur börkur, uppréttar greinar, má ekki hylja - bara þrýsta niður í yfirborð - halda röku og hafa í birtu meðan spírar
0225	Bistorta vivipara * - Kornsúra *	Smávaxin íslensk jurt sem blómstrar hvítum blómum.
0380	Brassica oleracea var. Gongylodes - Hnúðkál	Matjurt. Hnúðkálssyrkið 'Wiener Blå' hraðvaxta og bragðgott.
0661	Brassica rapa var chinensis - Blaðkál, pak choi	Matjurt. Blaðkál með stökkum blöðum.
0728	Brassica rapa var. Japonica - Mizuna salat	Matjurt. 30 cm há planta með dökkgrænum, gljáandi og skörðóttum blöðum. Hvítir stilkar með mildu sinnepsbragði. Góð krydduð viðbót við salatblönduna.
0386	Brassica rapa var. Rapa 'Snowball' - Næpa 'Snowball'	Næpa. Hvít, sæt og meyr. Á stærð við tennisbolta. Gefið gott pláss á milli plantna. Verjið fyrir kálflugu.
0987	Briza media - Hjartapuntur/Vetrarax 'Limouzi'	Gras. Hjartalaga smáöx á breiðum hangandi löntum puntgreinum. 40-70 cm. há hæð. Blómstrar í júlí - ágúst
0049	Bupleurum longifolium - Búkonubudda	Fjölær jurt - 70-100cm, upprétt, gul blóm í gulgrænum reifablöðum í sveip, reifablöðin og stilkar verða brúnir eftir blómgun, notuð í fjölær beð og góð til afskurðar
0643	Calceolaria biflora - Dvergaskór	Fjölæringur. Gul blóm í júní-júlí, 10-20 cm hátt. Harðgerður. Þrífst vel í hálfskugga og rökum, næringarríkum jarðvegi. Falleg steinhæðaplanta.
0052	Caltha palustris * - Hófsóley *	Fjölær, íslensk jurt, hæð 10-40 cm, hvít. blómast snemma.
0935	Campanul rapunculoides -	Fjölær jurt. Hæð 60-100 cm. Blóm ljósblá, stöku sinnum hvít, í ágúst. Kjörlendir sól til hálfskuggi.



Skriðklukka		
0936	Campanula alliariifolia - Vaxklukka	Fjölær jurtt. Blómstar hvítu í júlí - ágúst. Harðgerð. Þarf sólríkan vaxtarstað eða hálfskugga. Gerir litlar kröfur til jarðvegs, gróskumikil og auðræktuð.
0937	Campanula aucheri - Sunnuklukka	Fjölær jurtt. Blómstar fjólubláu í júní. Þarf sólríkan vaxtarstað. Sáð síðvetrar. ekki hulið og haft við 20°C fram að spírun. Spírar hægt, getur tekið 3 mánuði. Eftir spírun þarf lægra hitastig og næga birtu til að plöntur verði ekki of teygðar.
0751	Campanula carpatica blue - Hjartaklukka blá/fjólublá	Fjölær. Hæð 30-45 cm. Blóm fjólublá í júlí-september. Þrífst í næringarríki rakaheldinni en vel framræstri garðamold í sól eða litlum skugga. Blómstrar mikið. Getur þurft uppbindingu eða gott pláss til að dreifa úr sér. Harðgerð en getur verið skammlíf. Bláklukkuætt/Campanulaceae
0938	Campanula cervicaria - Hálsaklukka	Fjölær jurtt
0752	Campanula glomerata - Höfuðklukka	Fjölær. Hæð 30-50 cm. Fjólublá blóm í júlí-ágúst. Þarf næringarríkan léttan rakaheldinn jarðveg í sól eða etv. hálfskugga. Harðgerð og auðræktuð. Höfuðklukkan getur sáð sér nokkuð út. Bláklukkuætt/Campanulaceae.
0053	Campanula glomerata alba - Höfuðklukka, hvít	Fjölær. Hæð 30-50 cm. Hvít blóm í júlí-ágúst. Þarf næringarríkan léttan rakaheldinn jarðveg í sól eða etv. hálfskugga. Bláklukkuætt/Campanulaceae.
0054	Campanula komarovii - Viðarklukka	Fjölær, hæð 15-30 cm, djúpblá, blómast síðsumar
0753	Campanula lactiflora - Mjólkurklukka hvít/fjólublá/ljósblá	Fjölær. Hæð 70-120 cm. Blómstrar hvítum/fjólubláum/ljósbláum blómum í júlí og fram í september. Þrífst í sól eða etv. hálfskugga í rakaheldri næringarríki léttri garðamold. Þarf stuðning. Harðgerð og blómviljug. Bláklukkuætt/Campanulaceae.
0939	Campanula latifolia - Risaklukka, bland	Fjölær, hæð 80-100 cm, blómgast í júlí, hentar í beð, þarf stuðning.
0055	Campanula latifolia - Risaklukka, blá	Fjölær, hæð 80-100 cm, fjólublá, blómgast í júlí, hentar í beð, þarf stuðning.
0663	Campanula latifolia var. alba - Risaklukka, hvít	Fjölær, hæð 80-100 cm, hvít. Blómgast í júlí, hentar í beð, þarf stuðning.
0779	Campanula persicifolia - Fagurklukka	Fjölær harðgerð en oft skammlíf. Hæð 50-80 cm, þarf stuðning. Blómin stór blá/fjólublá í júlí-september. Þrífst best í sól og léttum næringarríkum jarðvegi vel framræstum en rakaheldum. Bláklukkuætt/Campanulaceae
0940	Campanula persicifolia - Fagurklukka, hvít	Fjölær harðgerð en oft skammlíf. Hæð 50-80 cm, þarf stuðning. Blómin stór hvít í júlí-september. Þrífst best í sól og léttum næringarríkum jarðvegi vel framræstum en rakaheldum. Bláklukkuætt/Campanulaceae
0664	Carex viridula - Gullstör	Lágvaxin íslensk grastegund sem vex m.a. í deiglendi, mýrum og nærri sjó.
0347	Centaurea cyanus mix - Garðakornblóm mix	Sumarblóm. Garðakornblóm yrki "Dwarf Pouce" Forsá í mars/apríl. Harðgerð og þrífst ágætlega í sendnum jarðvegi. Hæð 30-40 cm. Blandaðir litir blóma, blómgast í júní og fram á haust.
0061	Chamaecyparis lawsoniana -	Fallegur sígrænn runni sem þrífst vel hérlendis í skjóli, þarf sérstaklega skýla ungum plöntum



Fagursýprus 'Lulea'		
0941	Chlorophytum comosum 'Variegatum' - Veðhlaupari 'Variegatum'	Inniblóm
0065	Cicerbita alpina - Bláffill /Fjallablámi	Fjölær, hæð 150-200 cm, blár, blómgast í júlí-september, harðger, þarf uppbindingu, getur sáð sér og verður umfangsmikill.
0667	Cirsium arvense - Pistill	Falleg fjölær jurtt með purpurarauð blóm og þyrnótt blöð. Blómstrar seint á sumrin. Getur dreift aðeins úr sér og því óvitlaust að rækta í potti og takmarka dreifingu.
1069	Clematis Tangutika _ Bergsóley (hvít)	Einær stórgerð planta allt að 150 cm há, dregur nafn sitt af hirslum sem eru stór og þyrnótt. Blómin eru trektlaga, hvít eða fölblá/bleik. Plantan er eitruð.
1068	Clematis, ruby _ Bergsóley, dökkrauð	Aronia berjarunni, Allt að 3ja metra hár, harðgerður runni sem vill rakan, frekar súran jarðveg, PH 5 - 6.5. dökkblá æt ber.
0942	Clematis macropetala - Síberíubergsóley	Fjölær jurtt. Bergsóley með dauf fjólubláum blómum, blómstar í júlí - ágúst. Vafningsviður sem hengja þarf upp.
0070	Codonopsis clematidea - Postulínsklukka / fýlukofri	Fjölær, hæð 30-50 cm, Ýmsir litir, Blómgast í júlí-ágúst, Hentar í beð.
0071	Comarum palustre - Engjarós	Fjölær, hæð 15-25 cm, dumbrauð, Blómgast í júlí-september, íslensk.
1026	Coral Selection op - Beðrós margir litir	Beðrós, margir litir. frá Kanada 2022 . Nýpa.
0390	Coriandrum sativum 'Santo' - Kóríander 'Santo'	Bragðmikil kryddjurt.
0943	Cortusa brotheri - Urðarskúfa	Fjölær jurtt. Svipar til alpabjöllu/alpaskúfu
0074	Cortusa matthioli - Alpabjalla, bleik	Fjölær, hæð 20-40 cm, fjólublá, blómstrar júní. Alpaskúfa
0075	Cortusa matthioli f. albiflora - Alpabjalla, hvít	Harðgerður fjölæringur. Hvít blóm í maí-júní. Hæð 20-30 cm. Þrífst vel í venjulegri garðamold, vel framræstri. heppilegur undirgróður í skógum, skuggþolin. Alpaskúfa
0076	Cortusa turkestanica - Hirðingjabjalla	Fjölær, hæð 50-60 cm, bleik, blómstrar júní-júlí. Sáir sér nokkuð. Hirðingjaskúfa
0495	Cotoneaster adpressus - Skriðmispill	Tré og runnar, hæð 20-50 cm, bleik, blómgast í júní-júlí, Hentar sem þekjuplanta, rauð ber. Jarðlægur.
0781	Cotoneaster horizontalis - Hengimispill	Hægvaxta harðgerður runni. Hæð um 30-40 cm og breidd allt að 180 cm. Þarf skjólgóðan og sólríkan vaxtarstað. Jarðvegur vel framræstur eða sendinn nokkuð næringarríkur.



0077	Cotoneaster lucidus - Gljámispill	Runni sem getur náð 150-300 cm hæð. Lítillátleg blómgun í júní-júlí, Fallegir haustlitir
0078	Cotoneaster nebrodensis - Dúnmispill	Runni, lauffellandi, hæð 60-100 cm, blómlitur hvítur til fölbleikur
0472	Crataegus succulenta RD - Lagbyrnir RD (2019)	Tré eða runni sem getur náð allt að 6 m. í Kanada. Blómstrar hvítum blómum að vori, rauð ber að hausti. Er vindpolið en þolir salt illa. Þetta er frá Rick Durand, kanadískum plöntusérðingi, sem heimsótti okkur 2018 og gaf í framhaldi mikið magn ja sem hann taldi gæti hentað íslenskum aðstæðum.
0081	Cremanthodium arnicoides - Lotkarfa/Gulllotkarfa	Fjölær harðgerð planta sem kemur seint upp á vorin. Hæð 45-75 cm. Blómstrar gulum blómum í júlí. Þrífst best í næringarríkukum rakaheldum vel framræstum jarðvegi í sól. Körfublómaætt/Asteraceae
0082	Cremanthodium delavayi - Hélulotkarfa	Fjölær, hæð 50-80 cm. Blómstrar stórum gulum blómum í júní-júlí. Harðgerð fjallaplanta sem kemur seint upp á vorin. Þrífst best í næringarríkukum rakaheldum vel framræstum jarðvegi í sól. Körfublómaætt/Asteraceae
1020	Cremanthodium sp. - Körfu tegund	Fjölær harðgerð planta sem kemur seint upp á vorin. Hæð 45-75 cm. Blómstrar gulum blómum í júlí. Þrífst best í næringarríkukum rakaheldum vel framræstum jarðvegi í sól eða hálfskugga. Körfublómaætt/Asteraceae
0670	Crepis rubra - Roðaskegg	Bleikblómstrandi sumarblóm, oftast 15-30cm hátt. Þrífst vel í venjulegri garðmold, en nýtur sín best í góðri sól og helst í skjóli.
0730	Curcubita pepo - Skraut grasker	Mislit skraut grasker, flöskulaga. Klifurplöntur sem þurfa mikið pláss en rætur geta verið viðkvæmar við útplöntun. Þurfa langan vaxtartíma þannig að gróðurhús myndi henta við ræktun. Matjurt.
0729	Curcubita pepo 'Ambassador' - Dvergkúrbítur 'Ambassador'	Matjurt. Kraftmikil planta með dökk græn kúrbít aldin. Karl- og kvenblóm sem þarf að frjóvga.
0796	Cynoglossum nervosum - Refatunga	Fjölær. Hæð 30-70 cm. Blómstrar bláum blómum í júní-júlí. Kýs lífefnaríkan rakaheldinn léttann jarðveg. Þarf sólríkan stað í nokkru skjóli. Harðgerð og blómstrar mikið. Boraginaceae
0869	Dahlia 'Sunny Reggae'	Ræktað sem sumarblóm. Myndar þó hnýði sem hægt er að taka inn yfir veturinn. Forræktað inni í mars og vanið við útiveru þegar frosthætta er liðin hjá. Blómlitur: blandaðir tónar af gulu/appelsínugulu/rauðu. Hæð 30-50cm
0083	Daphne mezereum - Töfratré	Tré og runnar, hæð 50-120 cm, blómlitur bleikur, blómgast í apríl-maí. Þrífst best í næringarríkum, kalkríkum og rakaheldum jarðvegi á sólríkum stað. Rauð ber. . Öll plantan EITRUÐ og berin mjög EITRUÐ.
0564	Daphne mezereum alba - Töfratré hvítt	Smávaxinn lauffellandi runni, sem blómgast áður en hann laufgast. Blómin vanalega bleik eða rósröuð en hér hvít. Oftast greinafár á stuttum stofni og algengur rétt yfir eða undir metershæð. Plöntunni er illa við flutning og bregst ekki endilega vel við klippingum. Safinn er ertandi og getur stundum valdið exem útbrotum. Sé plantan borðuð getur hún orsakað eitrunarhrif, sem byrja vanalega með magakveisu. Best í sól eða hálfskugga og rökum jarðvegi, má vera nokkuð þungur og leirkenndur. Sérlega góð planta fyrir hunangsflugur/humlur/býflugur. Blómin eru falleg og hafa sætan ilm og koma mjög snemma vors. Síðsumars má svo dást að fallegum berjunum, þó ekki sé ráðlegt að hafa þau nærri matjurtaræktun en séu mjög ung börn á heimilinu er oft ráðlagt að fjarlægja berin áður en þau náu fullum þroska. Þó þau séu afar bragðvond, getur ungum börnum oft þótt spennandi að smakka á einhverju svona fallegu. Fuglarnir eru þó afar hrifnir af þessum berjum. Plantan hefur einnig gengið undir nafninu Týsbast.. Öll plantan EITRUÐ og berin mjög EITRUÐ.
1072	Datura Stramonium _ Broddepli	Blómfagurt tré. Tegund gullregns er ekki tilgreind.



0918	Daucus carota - Gulrætur	Matjurt. Fljótsprottnar gulrætur.
0084	Delphinium grandiflorum - Greifaspori	Fjölær, hæð 50-70 cm. Blóm blá í júní-ágúst. Getur þurft stuðning. Þrífst í veljulegri garðamold vel framræstri.
0085	Delphinium tatsienense - Kínaspori	Fjölæringur. Hæð 50-70 cm, skærblár, blómstrar júlí-ágúst. Þrífst í veljulegri garðamold vel framræstri. Getur þurft stuðning.
0086	Delphinium x cultorum - Garðaspori, blár	Fjölær. Hæð 90-150 cm. Blá blóm í júlí-ágúst. Þrífst í sól eða hálfskugga í næringarríkri en vel rakaheldri framræstri garðamold, nýtur góðs af húsdýraáburði að hausti og fljótandi áburði að sumri. Þarf stuðning og skjólgóðan stað. Riddaraspori er breytileg tegund af sóleyjarætt. Planta og eru eitruð.
0797	Delphinium x cultorum - Riddaraspori, fjólublár	Fjölær. Hæð 90-150 cm. Blóm fjólublá/dökkblá í júlí-ágúst. Þrífst í sól eða hálfskugga í næringarríkri en vel rakaheldri framræstri garðamold, nýtur góðs af húsdýraáburði að hausti og fljótandi áburði að sumri. Þarf stuðning og skjólgóðan stað. Riddaraspori er breytileg tegund. Sóleyjaætt/Ranunculaceae. Plantan er eitruð.
0798	Delphinium x cultorum - Riddaraspori, ljósfjólublár	Fjölær. Hæð 90-150 cm. Blóm ljósfjólublá í júlí-ágúst. Þrífst í sól eða hálfskugga í næringarríkri en vel rakaheldri framræstri garðamold, nýtur góðs af húsdýraáburði að hausti og fljótandi áburði að sumri. Þarf stuðning og skjólgóðan stað. Riddaraspori er breytileg tegund. Sóleyjaætt/Ranunculaceae. Plantan er eitruð.
0811	Delphinium x cultorum dark blue - Riddaraspori, dökkblár	Fjölær. Hæð 90-150 cm. Blóm fjólublá/dökkblá í júlí-ágúst. Þrífst í sól eða hálfskugga í næringarríkri en vel rakaheldri framræstri garðamold, nýtur góðs af húsdýraáburði að hausti og fljótandi áburði að sumri. Þarf stuðning og skjólgóðan stað. Riddaraspori er breytileg tegund af Ranunculaceae/Sóleyjaætt. Plantan er eitruð.
1058	Delphinium x cultorum, hvítur _ Riddaraspori	Fjölær. Hæð 90-150 cm. Blómin hvít í júlí-ágúst. Þrífst í sól eða hálfskugga í næringarríkri en vel rakaheldri framræstri garðamold, nýtur góðs af húsdýraáburði að hausti og fljótandi áburði að sumri. Þarf stuðning og skjólgóðan stað. Riddaraspori er breytileg tegund af Ranunculaceae/Sóleyjaætt. Plantan er eitruð.
0606	Dianthus barbatus - Stúdentadrottning	Fjölær eða tvíær, 20-30 cm, blandaðir litir, rauð, hvít, ljós- og dökkbleik. Blómgast júlí-september. Þrífst í léttum næringarríkum jarðvegi í sól.
0672	Dianthus plumarius - Fjaðradrottning	Fjölær, 30-40 cm, bleik, blómgast júlí-september, hentar í steinhæðir
0619	Digitalis grandiflora - Stórabjörg	Stórabjörg - tvíær jurt frá M-Evrópu - um 60cm (stundum allt að 120cm) - júlí, gul fingurbjargarblóm með dökkum dröfnum. Sáð við 20°C á rakt yfirborð í fullri birtu - lækka hita eftir uppkomu í 10-12°C í tvær til þrjár vikur - planta út eftir fyrstu frost. Verja gegn vetrarvætu. Blómgast árið eftir. Plöntur deyja oftast eftir fyrstu blómgun - en geta sáð sér út og haldið sér við á þann hátt.
0089	Digitalis purpurea - Fingurbjargarblóm	Tvíær. 100-120 cm. jafnvel hærri við kjöraðstæður. Blómstrar bleikum blómum á seinna ári. Þarf oft uppbindingu. Lækningajurt. Plantan er eitruð.
0944	Digitalis purpurea - Fingurbjargarblóm mix	Tvíær harðgerð planta. Hæð 80-120 cm. Blandaðir litir, blómstrar á seinna ári. Þrífst í sól eða hálfskugga. Þarf uppbindingu. Mjög eitruð planta. Græðisúruætt/Plantaginaceae
0782	Digitalis purpurea 'alba' -	Tvíær harðgerð planta. Hæð 80-120 cm. Hvít blóm, blómstrar á seinna ári. Þrífst í sól eða hálfskugga. Þarf uppbindingu. Mjög



	Fingurbjargarblóm hvítt	eitruð planta. Græðisúruætt/Plantaginaceae
0402	Diplotaxis tenuifolia - Klettasalat	Hefðbundið villt klettasalat, Bragðmikið og hægvoxta. Vel skörðótt blöð.
0542	Dodecatheon poeticum - Brekkugoðalykill	Blaðhvirfing oft grágræn, blómstönglar rísa uppúr hvirfingunni að vori eða snemma sumars. Hæð blómstöngla oft í kringum 20cm, harðgerður, kýs helst nokkuð rakan og frjóan jarðveg.
0091	Dodecatheon pulchellum - Skriðugoðalykill	Fjölær, 10-30 cm, bleik, blómgast júlí-ágúst, hentar í skógarbotna
0604	Doronicum plantagineum - Gemsuffill	Gemsuffill - fjölær jurt frá V-Evrópu - 40-60cm - júní/júlí, gular blómkörfur. Sáð við 20°C - gott að rúlla junum rösklega milli tveggja sandpappírsarka fyrir sáningu, spírun oft óregluleg.
0094	Dryas octopetala * - Holtasóley *	Íslenska þjóðarblómið. Dökkgræn leðurkennd og sígræn blöð, stór hvít skállaga blóm í júní, hárbrúða í ágúst. Hentar best í steinhæðir og rýran jarðveg.
0021	Edraianthus graminifidius - Grasbikar	Fjölær. Hæð allt að 10-12 cm. Blá, fjólublá blóm í júlí-ágúst. Þrífst í sól og léttum vel framræstum jarðvegi en rakaheldum
0097	Eleagneus commutata - Silfurblað	Silfurblað er óvenjulegur runni. Hann þolir mjög lélegan jarðveg enda í sambýlu við rótarbakteríu sem getur unnið köfnunarefni úr andrúmsloftinu. Þarf að vera í góðri birtu og er harðgerður. Myndar mjög sérstök ber og plantan öll nokkuð ólík flestum öðrum.
0098	Empetrum nigrum* - Krækilyng *	Lyngætt, 10-20 cm, dökkrauð, blómgast júní-júlí, harðger þekjuplanta, íslensk
0799	Eranthis hyernalis - Vorboði	Fjölær. Hæð um 10-15 cm. Blóm gul í mars-apríl. Þrífst í sól eða hálfskugga í frjóum kalkríkum og vel framræstum rakaheldum jarðvegi. Þolir ekki þurrk og getur verið skammlífur. Öll plantan er eitruð. Sóleyjaætt/Ranunculaceae
0517	Erigeron gaudinii - ónefndur jakobsfífill	Lágvaxinn jakobsfífill/kobbi (10-15cm) sem blómstrar bleiku í júlí/ágúst. Vill sólríkan stað og vel framræstan jarðveg. Frekar kalkríkan, en þolir líka hlutlausan.
1047	Erigeron multiradiatus - Geislakobbi	Harðgerð og auðræktanleg garðplanta
0519	Erigeron nanus - Dvergekobbi	Lágvaxinn jakobsfífill, ca 10cm, sem blómstrar ljósfjólubláu/bleikfjólubláu.
0853	Eriophorum scheuchzeri* - Hrafnafífa*	Íslensk fjölær planta. Hæð 20-30 cm. Blómin með hvítum hárum. Þrífst í eða við votlendi.
0104	Eryngium alpinum - Alpapyrnir	Fjölær, 60-100 cm, blá, blómgast júlí-ágúst. Getur verið skammlíf í potti.. Athugið að fyrsta sumarið er bara blaðvöxtur, annað sumarið er breytilegt hvort er blaðvöxtur, smávaxin blóm eða komin á fullt.. Þarf kaldörvun og því oft best að setja í pott sem er úti yfir hluta vetrar. Ef spíra ekki er oft ráð að láta þau vera úti fram á vorið eftir.. Hyljið einungis með þunnu lagi af mold/sandi.
0991	Eryngium horridum - Sveipþyrnir (án ísl nafns)	Fjölæringur. Sól og vel drenandi jarðvegur. Frekar viðkvæm í pottum.
0992	Eryngium serra - Sveipþyrnir (án ísl nafns)	Fjölæringur. Sól og vel drenandi jarðvegur. Frekar viðkvæm í pottum.



0993	Eryngium variifolium - Smásveipþyrnir	Fjölæringur. Sól og vel drenandi jarðvegur. Frekar viðkvæm í pottum.
0994	Eryngium yuccifolium - Snákasveipþyrnir	Fjölæringur
0570	Euphorbia palustris - Mjólkurjurt	Fjölær, 70-100 cm, gul, blómgast júní-júlí. Safinn eitraður.
0674	Festuca vivipara - Blávingull	Gras með stuttan fallegan punt, sem vex í móum, vallendi, melum og mýrarþúfum. Skríður ekki.
0106	Fritillaria meleagris - Vepjulilja	Fjölær, 20-30 cm, fjólublá, blómgast maí, laukur, harðger.
0107	Fritillaria meleagris f. albiflora - Vepjulilja, hvít	Fjölær, 30 cm, hvít, blómgast maí-júní, laukur, liljuætt.
0108	Fritillaria pallidiflora - Gaukalilja	Fjölær, 30-80 cm, fölgul, blómgast maí, laukur, liljuætt.
0834	Galeopsis tetrahit - Garðahjálmgras	Fremur sjaldgæfur slæðingur sem einkum vex við bæi og í þéttbýli. Algengara á Suðvesturlandi en annars staðar á landinu.
0724	Galium boreale - Krossmaðra	Krossmaðra er allt að 25cm há og blómstrar hvítum blómum í júlí. Rótin notuð til litunar.
0945	Gentiana asclepiadea - Haustvöndur	Fjörær jurt. 70-100 cm há. Blómstar bláu síðsumars. Sól itl hálfskugga. Þarf gott skjól.
0946	Gentiana asclepiadea var alba - Haustvöndur, hvítur	Fjörær jurt. 70-100 cm há. Blómstar hvítu síðsumars. Sól itl hálfskugga. Þarf gott skjól.
0112	Gentiana lutea * - Gulvöndur *	Fjölær jurt. Gul blóm. Júlí-ágúst. Hæð: 100-150 sm. Sól (hálfskuggi). Rakur og frjór jarðvegur.
0115	Gentiana septemfida - Klukkuvöndur	Fjölær jurt. Dökkblá eða purpurarauð blóm í júlí-ágúst. Hæð: 30-35 sm. Sól-hálfskuggi. Rakur og frjór jarðvegur.
0677	Gentianella amarella - Grænvöndur	Grænvöndur blómstrar grænblá/gulhvítum blómum í ágúst. Er allt að 30cm hár, einær og vex t.d. í þurrum grasbrekkum.
1016	Geranium erianthum - Frerablágresi	Fjölær. Hæð 30-50 cm. Blóm fjólublá með dekkri æðum í júní-júlí. Þrífst best í sól eða háfskugga. Jarðvegur næringarríkur og vel framræstur. Laufið fær haustliti.
0755	Geranium himalayense - Fagurblágresi	Fjölær. Hæð 20-30 cm. Blómstrar stórum bláfjólubláum blómum með rauðleitum/dökkum æðum í frá lokum júní- ágúst. Þrífst í sól eða hálfskugga. Jarðvegur frjór rakur/rakaheldinn vel framræstur. Harðgerð planta. Blágresisætt/Geraniaceae
0756	Geranium macrorrhizum - Ilmgresi	Fjölær. Hæð 40-60 cm. Blóm bleik í júlí-ágúst. Þrífst í sól eða hálfskugga í næringarríkum léttum jarðvegi rakaheldum en vel framræstum. Harðgerð planta. Blágresisætt/Geraniaceae.
0665	Geranium macrorrhizum 'White Ness' - Ilmgresi 'White Ness', hvítt	Fjölær jurt, 30-60cm há. Blómstrar hvítu í júní/júlí. Venjuleg garðmold. Best í sól eða hálfskugga.
0758	Geranium nodosum - Liðablágresi	Fjölær. Hæð 40-50 cm. Blóm frekar smá ljósfjólublá með dökkar æðar. Blómgun í júlí-september. Lauf ljósgræn glansandi. Þrífst í frjórrí vel framræstri en rakaheldri garðmold í sól eða hálfskugga. Harðgert og blómstrar mikið.



Blágresisætt/Geraniaceae		
0760	Geranium palustre - Mýrablágresi	Fjölær. Hæð 30-40 cm. Blóm skærbleik með dekkri æðar í júlí-september. Þrífst í sól eða etv. hálfskugga í léttum frjóum rakaheldum jarðvegi. Blágresisætt/Geraniaceae.
0763	Geranium platypetalum - Diskablágresi	Fjölær. Hæð 30-50 cm. Blóm fjólublá með dekkri æðum í júlí-ágúst. Þrífst í sól eða hálfskugga í næringarríkum léttum rakaheldum vel framræstum jarðvegi. Blágresisætt/Geraniaceae
0118	Geranium pratense - Garðablágresi	Fjölær jur. Blá-fjólublá blóm í júlí. Hæð 70-120 sm. Sól. Léttur og frjór jarðvegur.
0536	Geranium pratense mix - Garðablágresi blandað	Fjölær jur. Blómstrar í júlí. Hæð 70-120 sm. Sól eða hálfskuggi. Léttur og frjór jarðvegur. Blóm geta verið blá/fjólublá, hvít eða bleik, einlit eða tvílit.
0119	Geranium pratense 'Splish Splash' - Garðablágresi 'Splish Splash'	Fjölær jur. Hvít blóm með bláum flikrum. Júlí-ágúst. 30-40 sm. Sól. Léttur og frjór jarðvegur.
0120	Geranium sylvaticum * - Blágresi *	Fjölær jur. Fjólublá blóm. Júní-ágúst. 20-70 sm. Sól. Léttur jarðvegur.
0774	Geranium sylvaticum v. Rosea* - Blágresi, bleikt*	Fjölær. Hæð 20-30 cm. Blóm bleik í júní. Þrífst best í rakaheldum frekar næringarríkum jarðvegi í hálfskugga eða sól. Geraniaceae/Blágresisætt. Íslensk
0995	Geum chiloense - Rauðdalaffill	Fjölæringur. Hæð allt að 60 cm. Blómstrar í júlí - ágúst. Blómlitur rauður eða hlýgul ofkrýnd. Þolir hálfskugga .
0121	Geum rivale * - Fjalldalaffill/Fjalldæla *	Fjölær jur. Rjómalit til bleik blóm. 40-50 sm. Sól, hálfskuggi. Léttur og meðalfrjór jarðvegur.
0848	Glaucidium palmatum f. album - Bláskjár, hvítblóma	Fjölæringur. Hæð allt að 40 cm. Blóm hvít í lok maí-júní. Þrífst best í hálfskugga. Þrífst best í næringarríkum, djúpum og rakaheldum jarðvegi.
0123	Gnaphalium norvegicum * - Fjandafæla *	Fjölær jur. 15-30 sm. Júlí-ágúst. Omalotheca norvegica
0997	Godetia grandiflora - Meyjablómi 'Sybil'	Einær/sumarblóm. Sáð grunnt (bara nokkra mm djúpt) inni í febrúar. Getur tekið upp í mánuð að spíra. Blómstrar bleiku, hæð: 30cm
0349	Gypsophila elegans - Skrautslæða	Sumarblóm af hjartagrasaætt. Blóm hvít með bleikum æðum í júní-september. Ekki hærri en 50 cm. Harðgerð og blómviljug. Samheiti Skrautblæja.
0126	Hedysarum alpinum - Fjallalykkja	Fjölær jur. Rauð-fjólublá blóm. 40-80 sm. Júlí. Sól. Léttur, magur og vel framræstur jarðvegur.
0512	Hedysarum austrosibiricum - Purpuralykkja	Fjölær jur. Lilla-fjólublá blóm. 20-40 sm. Júní-júlí. Sól. Léttur, frjór og vel framræstur jarðvegur.
0127	Helenium hoopesii - Sumarmáni	Fjölær jur. Dökkgul blóm. 40-90 sm. Júlí-ágúst. Sól. Djúpur, rakur og frjór jarðvegur.
0998	Heliopsis helianthoides var scabra	Skammlífur fjölæringur, gul eða rauð/appelsínurauð blóm.



-Dagsauga		
0128	Helleborus foetidus - Klukkujóláros	Fjölær jurtt sem verður allt að 80 cm á hæð og 100 cm í þvermál. Stönglar uppréttir, harðir, sívalir, laufóttir, með hringlaga ör, lifa í tvö ár, græn til purpuralit, deyja þegar in hafa þroskast. Blómin grænleit. Einnig þekkt sem kirtiljóláros.
0129	Helleborus niger - Jóláros	sígræn, fjölær jurtt. Hvít blóm. 20-30 sm. Vetur-vor. Hálfskuggi (sól). Frjór jarðvegur.
0130	Helleborus orientalis - Fösturós	Fjölær jurtt. Dökkgul blóm. 40-90 sm. Júlí-ágúst. Sól. Djúpur, rakur og frjór jarðvegur.
0131	Helleborus orientalis ssp guttatus - Fösturós ssp guttatus	Fjölær jurtt. Hvít eða lilla blóm. 60-80 sm. Júlí-september. Sól. Djúpur, rakur og frjór jarðvegur.
0133	Hepatica nobilis - Skógarblámi	Afar falleg fjölær skógarplanta sem blómstrar um sama leiti og lafið byrjar að gægjast upp úr moldinni. Blómin bláfjólublá með hvítum flum. Þrífst best í hálfskugga og næringarríkri, moltublandaðri mold. Hefur reynst harðgerður og lætur vorfrost lítið á sig fá.
0679	Hepatica nobilis var rosea - Skógarblámi, rauður	Afar falleg fjölær skógarplanta sem blómstrar um sama leiti og lafið byrjar að gægjast upp úr moldinni. Blómin rauðleit með hvítum flum. Þrífst best í hálfskugga og næringarríkri, moltublandaðri mold. Hefur reynst harðgerður og lætur vorfrost lítið á sig fá.
0947	Hepatica transsylvanica - Kjarrblámi	Fjölær jurtt. Hæð 15 cm. Blómstrar hvítu í apríl - maí. Hentar vel í steinhæðir. Sól til hálfskuggi.
1000	Heuchera americana - Vínlandsroði 'Metalica'	Fjölæringur. Hæð 20 cm. Laufblöð purpurarauð. Blómstrar hvítu eða bleiku í ágúst -september. Þolir hálfskugga.
0134	Hieracium tomentosum - Loðffil	Fjölær planta af körfublómaætt. Þrífst best í sólskini. Skærgul blóm í júlí-ágúst. Verður 10-50 cm há.
0948	Hieracium villosum - Sifjarffill	Fjölær. Hæð allt að 25 cm. Blóm gul frá miðjum júní til loka ágúst eða lengur ef tíð er góð. Laufblöð grágræn, hvítoðin og geta verið sígræn. Þrífst í sól eða hálfskugga í frekar þurri og vel framræstri og ekki of næringarríkri gaðamold.
0135	Honckenya peploides - Fjöruarfi	Fjölær jurtt. Lítil hvít blóm. 15-20 sm. Júní. Sól. Vex í fjörusandi.
0136	Hordeum jubatum - Silkibýgg	Einært eða fjölært gras. Fölgræn til purpuralit blóm. 40-60 sm. Júlí-ágúst. Sól. Meðalfrjór og velframræstur jarðvegur.
0137	Horminum pyrenaicum - Drekaþin	Fjölær jurtt. Fjólublá blóm. 30-45 sm. Júlí-ágúst. Sól. Léttur, meðalfrjór jarðvegur.
1049	Hosta - Brúska	Brúskur eru fjölbreytt ættkvís sem eru mikið ræktaðar vegna blaðfegurðar og geta orðið stórar og tilkomumiklar plöntur. ið er haft í kæli þar til því er sáð snemma vors.
1001	Hypericum androsaemum - Ilmgullrunni 'Albury purple'	Fjölæringur.
0138	Hypericum perforatum - Jónsmessurunni	Fjölær jurtt með mörgum greinum og gulum blómum, einnig nefnd Jóhannesarrunni (St. John's Wort). Hún vex villt víða um heim, um mest alla Evrópu, Asíu, og Norður Ameríku. Hefur mikið verið notuð í meðferð í fjölmörgum hjátrúum og við taugaröskunum. Þeir hlutar plöntunnar sem eru notaðir í náttúru- og jurttalyf eru blómin og blöðin, blöðin þó í minna mæli. Gróðursetningartíminn er snemma vors þegar öll hættu á frosti er yfirstaðin. Best er að byrja á því að setja hana niður innandyra í heitu umhverfi með sól og setja hana svo aftur niður seint um vorið. Umpottun á sér stað þegar plönturnar eru um 5



		cm. Passa verður að hafa um 30 cm á milli plantnanna þegar þær eru settar niður vegna þess að rætur þeirra breiða mikið úr sér. Það getur tekið in allt að þrjá mánuði að spíra. Vafasamt er að trúá um of á lækningamátt Jónsmessurunnans.
0708	Hypericum x inodorum - Gullrunna blendingur	Fjölær blendingur gullrunna.
0139	Incarvillea compacta - Tibetglóð	Fjölær jurtt allt að 30 cm há. Blómin eru stór fölpurpuralit/dökk bleik utan með gulri miðju og hvítu mynstri, blóm jaðrar sléttir. Blómgast í júlí /ágúst. Þrífst best í sól og næringarríkum jarðvegi mjög vel framræstum. spírar við 15-20° C, hulið með mjög þunnu lagi af sáðmold. Ef hefur ekki spírað eftir 20-30 daga má reyna kuldameðferð.
0151	Incarvillea mairei - Kínaglóð	Fjölær, verður um 30-40 cm há. Blómgast í júlí /ágúst, dökk bleikum/purpurarauðum blómum með gulri miðju og hvítu mynstri. Þrífst best í sól eða hálfskugga og næringarríkum jarðvegi mjög vel framræstum. spírar við 20° C, hulið með þunnu lagi af sáðmold.
0873	Inula - Ógreint "sunnu" blóm (mögulega Goðasunna)	Kýs þurran og frekar rýran jarðveg á sólríkum stað.
0600	Inula orientalis - Hlíðasunna	Hlíðasunna - fjölær jurtt frá V-Asíu - 30-60cm - júlí/ágúst, gular blómkörfur. Sáð við 20°C að vori - spírun oft hæg og óregluleg.
0429	Ipomoea aquatica - Vatnaspínat (Entsai Bamboo)	Vatnaspínat. Klifurplanta. Vex í rökum jarðvegi og við vatn. Lauf og Ungir sprotar eru eldaðir eða borðaðir hráir. Ef ræktuð við eða nálægt vatni þarf það að vera ómengað þar sem plantan getur safnað í sig þungmálmum. Getur orðið að illgresi við réttar aðstæður.
0616	Ipomea purpurea 'Morning glory' - Klukkubróðir / roðavafklukka 'Morning Glory'	Klukkubróðir - einær klifurjurt frá M-Ameríku - 300cm - maí-sept, purpurabláar klukkur. Sáning: Leggja í volgt vatn yfir nótt - sá svo við 25°C í björtu. Sá í pottinn sem plantan á að vaxa í allt sumarið, því hún þolir ekki umpottun. Inniplanta eða gróðurhús. Þarf net eða þræði til að klifra upp eftir - einnig hægt að forma á hring.
0142	Iris setosa - Engjaíris	Fjölær jurtt með jarðstöngla. Hæð 15-90 cm. Blómin ljós blá-fjölublá til purpura í júní-júlí.
0141	Iris setosa var arctica - Engjaíris var arctica	Fjölær planta af sverðliljuætt. Verður ekki nema 10-30 cm há, blómstrar fjölubláum blómum í júlí. Sólelsk. Þiggur næringarríkan og loftmikinn (moltublandaðan) jarðveg, gjarnan sendinn. Harðgerð planta.
0800	Iris vetisulata - Íris, dökkblá	Fjölær. Íris af óþekktum uppruna. Hefur reynst harðgerð. Sverðliljuætt/Iridaceae
0996	Kalmia procumbens* (syn. Loiseleuria procumbens) - Sauðamergur *	Fjölær. Sígrænn jarðlægur íslenskur smárúnni. Blóm bleik eða fölbleik í júní. Þrífst í sól og meðalþurrum vel framræstum jarðvegi sem er súr.
0921	Kartöflu - High Dormancy Diploid Mix	Matjurt. Botanísk af Solanum tuberosum. Kartöflu af tvílitna kartöflum „high dormancy” þetta eru mjög fjölbreyttar kartöflur, nokkuð primitivar í útliti og í ýmsum litum og formum. Það þarf að forrækta og kostur að hafa gróðurhús til þess. Í FB hópnum „Kartöflurækt af i” eru ýtarlegar leiðbeiningar um ræktun og um að gera að ganga í hópinn til að geta verið í sambandi við aðra í þessari ræktun
0988	Kartöflu - Solanum tuberosum, Litla Háeyri OP	Matjurt. Ýtarlegar upplýsingar um ræktun kartaflna af i má finna á facebook hópnum „Kartöflurækt af i“ og um að gera að ganga í hópinn til að geta verið í sambandi við aðra í þessari ræktun. Það þarf að forrækta kartöflur af i innan dyra og kostur er að hafa gróðurhús til þess. Þetta er af úrvali tvílitna kartaflna sem hafa reynst vel í sendnum jarðvegi á Suðurlandi.



Móðurplönturnar eru af um 20 klónum og eru býsna breytilegar. Því má búast má við töluverðum fjölbreytileika í lögum, lit og bragðgæðum kartaflnanna. Móðurplönturnar eiga það þó sameiginlegt að hafa gefið ágætis uppskeru, vera með miðlungs- til gott geymsluþol, vera heilbrigðar og bragðgóðar. Þær koma allar með kartöflur sem eru að mestu gular í skurðinn þó hýðið sé ýmiskonar.

1084	Kartöflu <i>Solanum tuberosum</i> Godzilla	
0145	<i>Koeleria glauca</i> - Blástrýgresi	Lágvaxið skrautgras með blágráu laufi. Kemur vel undan vetri óvarið. Sólríkur vaxtarstaður ákjósanlegur.
1075	<i>Laburnum</i> - Gullregn	Heiðgult afbrigði af flaelisblómi.
0576	<i>Laburnum alpinum</i> - Fjallagullregn	Harðgert tré af ertublómaætt sem blómstrar gríðarfallegum gulum blómklösum snemma sumars. Þokkalega vind og saltþolið, en blómstrar best á sólríkum stöðum. Stofn og greinar eru sérlega eftirsótt hjá rennismiðum og öðrum sem vinna úr fallegum viðnum. Gullregn getur valdið eitrunaráhrifum sé það borðað.
0950	<i>Laburnum anagyroides</i> - Strandgullregn	Lauffellandi tré 5 - 7 m hátt. Blómstar guli síðla vors
0146	<i>Larix decidua</i> - Evrópulerki	Lerkistegund af þallarætt, upprunið úr fjalllendi Mið-Evrópu, aðallega Ölpunum og Karpatafjöllum og í vex í allt að 2400 metra hæð. Skógræktin hallast að því að "evrópulerki taki við af rússalerki sem helsta lerkitegundin í ræktun á Íslandi þegar hlýnar og sumur lengjast. Tími þess er þó ekki kominn og verður varla fyrr en októbernámuður er orðinn nokkuð örugglega frostlaus.". Lerki skal bara hylja með þunnu lagi af jarðvegi, en athugið að spírun á lerkii er oft léleg og því mælt með að sá mjög þétt. Lerki þurfa vanalega kaldörvun og því óvitlaust að sá junum í potta/bakka sem standa úti yfir vetur.
0683	<i>Larix X marschlinsii</i> - Sifjalerki	Sifjalerki lendir í töluverðu haustkali, en þolir það ágætlega og verður því einna mesta "skúlptúrplantan" af lerkii tegundum. Vex nokkuð hratt. Einnig þekkt undir gamla nafninu <i>Larix x eurolepis</i> . Lerki skal bara hylja með þunnu lagi af jarðvegi, en athugið að spírun á lerkii er oft léleg og því mælt með að sá mjög þétt. Lerki þurfa vanalega kaldörvun og því óvitlaust að sá junum í potta/bakka sem standa úti yfir vetur.
0852	<i>Lathyrus filiformis</i> - Þráðertur	Fjölæringur. Hæð allt að 40 cm. Blómgast á vorin, blómin rauð-purpura til fjólublá á litinn. Þrífst best í frekar mögnum jarðvegi, vel framræstum og sól. Ertublómaætt/Fabaceae
0147	<i>Lathyrus japonica</i> ssp. <i>maritimus</i> * - Baunagras	Fjölært ertublóm sem lifir í fjörusandi og á heimkynni sín í Asíu, Evrópu, Norður- og Suður-Ameríku. Rótargerlar sem lifa í hnýðum á rótum baunagrass vinna köfunarefni úr andrúmsloftinu og bæta þannig vaxtarskilyrði. Fremur sjaldgæft í íslenskri náttúru. Það er afar viðkvæmt fyrir beit en getur orðið nokkuð áberandi þar sem lengi hefur verið beitarfriðun eða lítil beit, eins og t.d. á Ströndum.
0513	<i>Lathyrus linifolius</i> var <i>montanus</i> - Lyngertur	Fjölær jurtt, 15-30 cm. Blómin bláleit í júní.
0148	<i>Lathyrus vernus</i> - Vorertur	Fjölær jurtt, 20-50 cm. Blómin rauðfjólublá, síðar grænblá. Blómgast í maí -júní.
1023	<i>Lathyrus vernus</i> f. <i>albiflorus</i> - Vorertur, hvítar	Fjölær jurtt. Hæð 20-50 cm. Blómin hvít. Blómgast í maí -júní. Þrífst best í sól og venjulegri garðamold, léttri og vel framræstri.



0150	Leontopodium kurilense - Eyjahlíma	Fjölær jurtt af körfublómaætt, allt að 20 sm há. Stönglar uppréttir, ógreindir. Harðgerð-meðalharðgerð, plantan verður óeðlilega græn og slöpp í frjóum jarðvegi. Töluvert breytileg tegund.
0603	Leuzea rhapontica - Hjartakornblóm	Hjartakornblóm, skarihúnn - stórgerð fjölær jurtt frá Alpafjöllum - 60-100cm, júlí/ágúst, purpurarauðar blómkörfur. Sáð við 20°C - spírun oft hæg og óregluleg. Það þrífast best í rökum, kalkríkum jarðvegi.
0408	Levisticum officinale - Skessujurt	Fjölær jurtt, 150-200 cm. Gulleit blóm í júlí-ágúst. Blöðin krydd.
0632	Lewisia pygmaea op - Dvergblaðka	Fjölær. Dvergblaðka (Lewisia pygmaea) er fjölær jurtt af ættinni Montiaceae/Fjallablaðka. Hæð upp. 5-10 cm. Blómstrar mikið frá júní og fram í september ef hún er í kjöraðstæðum. Blómin purpurarauð eða bleik oftast með gulm/hvítum blómbotni. Laufblöðin eru mjó og sölna á haustinn, svo ekki henda henni hún kemur aftur upp að vori. Þrífst best í sól og léttum hæfilega rökum næringarríkum jarðvegi sem er ekki of blautur. Þóir ekki blautan klesstan jarðveg. Hún er ættuð frá vestur Bandaríkjunum frá Alaska og Alberta til Kaliforníu og New Mexico. Hún blandast auðveldlega öðrum tegundum ættkvíslarinnar. Náttúrulegir vaxtarstaðir eru í 2745-4020 m h. y. s., það eru gróðurlitlir staðir til fjalla, lágvaxið gras eða mól og grýttir staðir, rakt eða þurrt á blómgunartímanum.
0154	Leymus arenarius* - Melgresi *	Fjölært gras, 50-90 cm. Blómgast í júní, í ágúst- september. ið þarf að komast í a.m.k. 2-4 cm dýpt til að spíra.
0878	Ligularia (ógreind)	Mögulega skessuskjöldur eða turnskjöldur. Hæð ca 150cm. Gul blóm á stöngli.
0605	Ligularia dentata - Meyjarskjöldur	Meyjarskjöldur, skjaldmeyjarfífill - stórvaxin, fjölær jurtt frá A-Asíu - um 80cm - ágúst, gular körfur á dökkum blómstönglum. Sáning við 20°C - oftast vandræðalaus ef ið er gott.
0156	Ligularia hodgsonii - Blómaskjöldur	Fjölær jurtt, 60-80 cm. Rauðgul blóm í ágúst-september.
0801	Ligularia przewalskii - Turnskjöldur	Fjölær. Hæð 100-150 cm. Blóm gul frá miðjum júlí-ágúst. Þrífst í rakaheldum frjóum jarðvegi í sól eða hálfskugga. Harðgerður. Körfublómaætt/Asteraceae
0157	Ligularia wilsoniana - Skessuskjöldur	Fjölær jurtt, 120-200 cm. Gul blóm í júlí-ágúst. Vökva vel.
0628	Lilium martagon album - Túrbánlilja hvít	Evrásísk liljutegund. Áberandi blómliturinn og stærðin gera hana eina mest einkennandi evrópskra lilja. Tegundin þrífst í frjósömum skógum, í kalkríkum jarðvegi á hálfskyggðum svölum stöðum. Aðeins á hálendi vex hún upp fyrir skógarmörk á engjum og ökrum, sérstaklega með öðrum hávöxnum gróðri. Verður 30-150 cm há. Blómliturinn vanalega bleik-fjólublár, með dökkum blettum, en er mjög breytilegur, frá nær hvítum til næstum svartur. Blómin eru ilmandi. Mörg blóm geta verið á hverri plöntu, og allt að 50 geta verið á kröftugum plöntum.
0161	Lonicera alpigena - Fjallatoppur	Runni, 0.5-1 m. Blóm gulgræn með rauða sliktu að vorlagi. Dökkrauð óæt ber að hausti.
0951	Lonicera deflexicalyx - Gultoppur	Tré eðarunni. Lauffellandi runni allt að 2 m. hár. Blómlitur gulur í júní-júlí. Rauð ber að hausti. Harðger, plássfrekur runni sem þarf reglulega snyrtingu.
0162	Lonicera deflexicalyx v. xerocalyx - Sveigtoppur	Runni allt að 1.5-2 m. á hæð. Blómlitur gulur að vori eða snemma sumars. Þrífst venjulegri garðamold vel framræstri í sól eða hálfskugga.



1017	Lonicera demissa - Hverfitoppur	Tré og runnar. Hæð allt að 4 m. Blóm fölgul í byrjun sumars. Þrífst í sól eða hálfskugga í meðalfrjóum, rakaheldum jarðvegi. Ber dökkrauð, kringlótt og gljáandi.
0163	Lonicera hispida - Klukkutoppur	Harðgerður, vindþolinn lauffellandi runni. Appelsínugul ber í júlí. Blómstrar gulhvítum klukkum. Full hæð 100-150 cm en söluhæð 20-40 cm. Sólelskur.
0549	Lonicera involucrata 'Kera' - Glótoppur 'Kera'	Harðgerður, hraðvaxta, skuggþolinn, vindþolinn, seltupolinn... Þetta er runninn fyrir erfiðar aðstæður. Laufin dökkgræn, stór og nokkuð glansandi. Blómstrar gulu snemma sumars og myndar svört ber síðsumars, sem eru óæt en ágætis skraut á runnanum. Góður í limgerði, en hraður vöxturinn kallar á nokkuð örar klippingar. Hæð oftast á milli 1 og 2metrar.
0164	Lonicera nigra - Surtartoppur	Runni, -1,5 m. Móbleik blóm að vori eða sumri. Blásvört ber.
0952	Lonicera tatarica 'Arnold Red' - Rauðtoppur 'Arnold Red'	Tré og r, 2-4 m. Blómin hvítgul til skærrauð vor eða sumar. Berin skarlatsrauð til appelsínugul.
0165	Lonicera xylosteum - Dúntoppur	Runni, -3 m. Gulhvít blóm að sumri. Berin rauð, sjaldan gul.
0550	Lonicera xylosteum nana op - Dúntoppur nana (dverg)	Runni. Tegundin getur náð 3metra hæð, en 'nana' milli 1 og 2m. Gulhvít blóm að sumri. Berin rauð, sjaldan gul.
0166	Lotus corniculatus - Maríuskór	Maríuskór er lágvaxin, fjölær planta sem blómstrar gulum ertublómum. Gul blóm frá júní og mest allt sumarið. Hæð: 20-30 cm. Þarf sólríkan vaxtarstað og vetrarskýli.
0874	Lupinus hartwegii 'Avalune red-white'	Lágvaxin einær lúpína/sumarblóm. Forsáð inni.
0875	Lupinus nootkatensis - Alaskalúpína	Fjölær. Alaskalúpína er 30 til 90 sentimetra há fjölær jurtt af ertublómaætt. Hún ber blá eða fjólublá blóm. Alaskalúpína hefur lengi verið notuð í landgræðslu á Íslandi en er upprunalega frá Alaska. Náttúruðistofnun álitur alaskalúpínu ágenga tegund, sem rétt er að hafa í huga þegar henni er fundinn staður.
0528	Lupinus nootkatensis 'Flensburg' - Alaskalúpína 'Flensburg'	Alaskalúpína er 30 til 90 sentimetra há fjölær jurtt af ertublómaætt. Hún ber blá eða fjólublá blóm. Alaskalúpína hefur lengi verið notuð í landgræðslu á Íslandi en er upprunalega frá Alaska. Náttúruðistofnun álitur alaskalúpínu ágenga tegund. Yrkið 'Flensburg' er rauðfjólublárra og skrautlegra en venjuleg alaskalúpína.. Myndir: Sigurður Arnarson
0167	Lupinus polyphyllus - Garðalúpína	Fjölær. Hæð 80-140 cm. Blómin blá, purpuralit, bleik, rauð eða hvít í júlí. Þrífst í meðal næringarríkum jarðvegi rakaheldum en vel framræstum í sól.
1063	Lupinus Polyphyllus _ Skrautlúpína, hvít	Fjölær, hæð 200-390 cm, dökk rauð, blómgast í júlí-september. Klifurjurt
0169	Lupinus x regalis - Skrautlúpína, fjólublá	Fjölær planta. Blómstrar gulum, bleikum, bláum, rauðum eða hvítum blómum í júní-júlí, verður 60-100 cm. Þarf sólríkan stað. Þrífst best í þurrum og vel framræstum jarðvegi.
0836	Luzula luzuloides - Kjarrhæra	Af sefætt. Hefur þrífst vel í Lystigarðinum á Akureyri. Auðvelt að fjölga með skiptingu. Í beð með fjölærum jurttum, eða í beð með runnum.
0687	Luzula nivea - Mjallhæra	Harðgert, fjölært gras. Oft sígrænt. Stráin oft í kringum 30-50cm há og blómstönglar nokkru hærri. Blóm hvít/móhvít í júlí. Gott í vel framræstum jarðvegi, sem má þó vera rakur, í sól eða hálfskugga. Gerir ekki kröfu um sérlega frjóan jarðveg.



Juncaceae/Sefætt		
0757	Luzula sylvatica - Lundahæra	Fjölær. Hæð 30-70 cm. Blóm ljósbrúnleit í júlí. Þrífst best sól eða hálfskugga í rökum frekar súrum jarðvegi eða venjulegri garðamold. Harðgerð. Juncaceae/Sefætt
0573	Lychnis calcedonica - Skarlatshetta/Ástareldur	Fjölær jurt, 50-90 cm. á hæð. Skær skarlatrauð/rauð blóm í júlí. Þrífst í næringarríkum rökum jarðvegi vel framræstum í sól eða hálfskugga. spírar við 18-20° C. hulið lauslega.
0173	Lychnis viscaria - Límberi	Fjölær jurt, 30-50 cm. Purpurrauð blóm í júní-júlí.
0410	Lycopersicon esculentum - Smátómatar	Matjurt.Smátómatar yrki "Vilma". Tómatar vaxa best við 20-24°C hita. Tómatplöntur þola ekki frost og dafna einungis í mikilli birtu. Jarðvegur þarf að vera frjór og gott er að skipta árlega um mold á plöntunum. Þær geta myndað stórt rótakerfi og þurfa því stóra potta. Einstofna plöntur þarf oft að binda upp. Tómatplöntur þarf að vökva vel.
1004	Maackia amurensis - Drekamakkía	Tré og runnar.
0586	Malus 'Starlite' op - Skrautepli 'Starlite'	Skrautapaldur - tré af ræktunaruppruna - 2m - maí/júní - hvít blóm - kaldörvun við 4°C í 8 vikur svo við 20°C.
1034	Malus 'Tinkerbelle' op Canada - Skrautepli 'Tinkerbelle' op	Skrautapaldur, tré af ræktunaruppruna. Hæð allt að 2m. Blómgun maí/júní - dökkbleik blóm. Kaldörvun við 4°C í 8 vikur svo við 20°C. frá Kanada 2022
0953	Meconopsis - Blásól, blandað	Fjölær jurt. Blásól, blandað
0182	Meconopsis betonicifolia - Blásól /Garðablásól	Blásólin fagra af draumsóleyjarætt er lítið fyrir þurrk, en er harðger og stendur sig oftast best í frjóum, rökum jarðvegi. Þarf ekki sólríkasta staðinn og hentar betur í skjólsælan hálfskugga. Hún er fjölær, en breytilegt hversu langlíf hún verður. Sáir sér nokkuð og getur því oft séð um að viðhalda sér sjálf. Sáning þarf ekki að fara fram í háum hita og spírun gengur oft betur við 10-12 gráður. Blómgun stendur vanalega yfir í júlí, en eftir aðstæðum og árferði getur verið heldur fyrr eða heldur síðar. Hæð: 80-160cm
0183	Meconopsis betonicifolia 'Alba' - Blásól, hvít	Blásólin fagra af draumsóleyjarætt er lítið fyrir þurrk, en er harðger og stendur sig oftast best í frjóum, rökum jarðvegi. Þarf ekki sólríkasta staðinn og hentar betur í skjólsælan hálfskugga. Hún er fjölær, en breytilegt hversu langlíf hún verður. Sáir sér nokkuð og getur því oft séð um að viðhalda sér sjálf. Sáning þarf ekki að fara fram í háum hita og spírun gengur oft betur við 10-12 gráður. Blómgun stendur vanalega yfir í júlí, en eftir aðstæðum og árferði getur verið heldur fyrr eða heldur síðar. Hvíta afbrigðið oft heldur minna en blá. Hæð: 80-160cm
0184	Meconopsis grandis - Risablásól / Fagurblásól	Fagurblásól er mjög svipuð blásólinni en getur verið með heldur stærri blóm á lengri blómleggjum og blómlitur oft nokkuð dýpri. Hentar best á skjólsælan stað með skugga og sól, rökum og næringarríkum jarðvegi. Blómgunartími í kringum júlí mánuð. Hæð 80-160cm
0726	Meconopsis racemosa - blásól án ísl. Heitis	Mynd má t.d. sjá hér: https://www.plant-world-seeds.com/store/view_seed_item/2796
1005	Mentzelia lindleyi - Gullbursti	Fjölæringur
0577	Mertensia maritima - Blálilja	Jarðlægur fjölæringur skyldur hjólkrónu sem finnst víða í íslenskum fjörum, vanalega í fjörusandi rétt ofan við flæðarmál.



		Stönglar bláhvítir, blómgast í júní/júlí, blómin fyrst rauð svo blá.
0186	Meum athamanticum - Bjarnarrót	Fjölær kryddjurt af sveipjurtaætt með angan af anís. Blómstrar hvítum blómsveipum í júlí/ágúst. Kýs meðalrakan, frjóan jarðveg á nokkuð sólríkum stað. Hæð: 30-60cm
0188	Mimulus lewisii/Erythranthe lewisii - Rósatrúður - Bleikt/rautt apablóm	Fjölær en stundum skammlíf planta sem blómstrar bleikum blómum uppúr Jónsmessu og fram á haust. Stönglar oft frá 30cm til 50cm að hæð. Sáir sér nokkuð. Kýs rakan, frjóan jarðveg í sól eða hálfskugga.
0954	Muscari armeniacum - Demantslilja	Laukplanta. Harðgerð. Hentar í steinhæðir. Blómin ilmandi. Blómstrar bláu í apríl - maí
0803	Muscari botryoides - Perlulilja	Fjölær laukjurt. Hæð 15-20 cm. Blómin blá/himinblá í apríl-maí. Þrífst í næringarríkri léttari garðamold í sól eða hálfskugga. Harðgerð og auðræktuð. Aspasætt/Asparagaceae
0689	Myosotis australis - Gullmunablóm	Gullmunablóm er náskytt gleym-mér-ei. Blómstrar gulum blómum frá miðju sumri og áfram. Oftast skammlífur fjölæringur. Kýs vel framræstan rýran jarðveg í sól. Hæð 20-30cm.
0690	Narcissus bulbocodium - Pilsalilja	Dvergvaxinn ættingi páskalilju. Blómstrar snemma vors. Fyrstu árin fara bara í að mynda forðahnýðið (laukinn) áður en kemur að blómgun. Kýs léttan, frjóan og vel framræstan jarðveg í sól, en líklega best í garðskála. Oft ansi skammlíf. Blómlitur gulur eða gulhvítur.
0192	Narcissus pseudonarcissus - Páskalilja	Páskaliljur eru fjölærar laukplöntur. Úr í getur tekið 5-10 ár að mynda fullorðna blómstrandi plöntu.
0407	Nasturtium officinale - Brunnkarsi	Frábær til að rækta inni sem skraut á kalda rétti eða sem krydd í salatið. Auðveldur í ræktun, 30 cm.
0353	Nemophila menziesii 'Baby blue eyes' - Vinablóm 'Baby blue eyes'	Blómfagurt sumarblóm sem þrífst best í sól eða hálfskugga. Blómin himinblá með hvítum blómbotni í júní-september. Verður 20-30 cm hátt. Samheiti Garðasnót. Ætt Hydrophyllaceae/Hunangsjurtaætt.
1035	Nemophila menziesii var. atomaria 'Snowstorm' - Vinablóm	Sumarblóm sem þrífst best í sól eða hálfskugga. Blómin hvít með litlum dökkum doppum í júní-september. Verður 20-30 cm hátt. Hægt að sá beint út eða forrækta inni sáð í apríl.
0193	Nepeta subsessilis - Hamranípa	Fjölær jurt af varablómaætt, sem fer best í hálfskugga og kýs rakan jarðveg. Mjög harðger og auðveld. Blómstrar följólubláum blómkrönsum á blómstilk. Hæð: allt að 100cm
0354	Nicandra physaloides - Eplabíkar	Meðalharðgert sumarblóm af náttskuggaætt, sem blómstrar fallegum daufbláum blómklukkum og oft ræktað til skrauts. hylkin sem myndast eftir frjóvgun eru einnig nokkuð skrautleg. Kýs nokkuð sólríkan stað í vel framræstri, rakri, frjórri mold. Getur blómstrað fram á haust, en hvert blóm er skammlíft. Plantan er ýmist sögð æt eða eitruð og til eru rannsóknir sem sýna ýmist eitrun og ekki eitrun. Í öllu falli skynsamlegt að umgangast fegurðina af varúð og skynsemi, líkt og flest af náttskuggaætt. Hæð:100-150cm
0355	Nigella damascena - Skrautfrú	Suðurevrópsk jurt af sóleyjaættmeð hvít eða blá blóm; in notuð sem krydd, stráð yfir brauð og kökur
0412	Ocimum basilicum 'Piccolino' - Basilika 'Piccolino'	Basilika með litlum blöðum. Helst vel safaspennt út af litlu blöðunum. Mjög bragðgóð og auðveld í ræktun.
0415	Ocimum basilicum purpureum -	Matjurt. Purpurabasilika yrki "Red Rubin". Hin sívinsæla kryddjurt fer best innandyrá, sökum þess hve hitakær hún er. Gott er



	Basilika, fjólurautt	að klippa reglulega af henni til að hún þétti sig, en jafnframt seinka því að hún myndi blóm.
0738	Ocimum basilicum 'Sweet Genovese' - Basilika 'Sweet Genovese'	Matjurt. Klassísk basilika. Stór, kúpt blöð og bragðgóð. 40 cm.
1046	Omalotheca norvegica - Fjandafæla	Íslensk jurt, algeng á norðanverðu landinu.
1081	Oplopanax horridus -	
0879	Osmanthus fragrans semperflorens	Fallegur, ilmandi runni frá Asíu. Sigrænn við réttar aðstæður. Of viðkvæmur utandyra hér á landi, þar sem hann þolir mjög lítið frost og vill heit sumur, en gæti verið fullkominn fyrir garðskála. Afbrigðið 'semperflorens' blómstrar sérlega mikið og er harðgerðari en restin. in geta þurft nokkuð langan tíma til að spíra, en sáning í pott úti að vetri hefur gefist ágætlega og spírar þá um sumarið.
0198	Papaver cambricum - Gulsól	Fjölær jört, 30-60 cm há og ber gul eða rauðgul blóm í júní og fram eftir sumri. Vill sólríkan vaxtarstað og léttan jarðveg. Getur sáð sér nokkuð mikið. Hentar í blómabeð og blómaengi þar sem hún fær að valsa um.. (syn. meconopsis cambrica)
0199	Papaver nudicaule mix. - Garðasól bland.	Fjölæringur. Fremur hávaxin planta (25–40 sm) sem blómstrar stórum hvítum, gulum eða appelsínugulum blómum í júní. Sáir sér talsvert.
0200	Papaver orientale - Tyrkjasól, risavalmúi, rauð	Fjölær, 60-90 cm á hæð. Blóm rauð, appelsínugul eða fölbleik, oftast með purpurablett við grunninn, í júlí-ágúst.
0955	Papaver orientale - Tyrkjasól	Fjölær jurt. Ofkringdur, appelsínugulur
0202	Papaver radicum Subsp. stefanssonii* pink - Stefánssól bleik *	Fjölær harðgerð íslensk planta. Blómstrar fölbleikum blómum, blómstrar mikið og langt fram á sumarið. Þrífst best í sendnum jarðvegi en getur vel þrífist í venjulegri garðamold með nokkuð gott frárennsli en getur þá orðið skammlíf. Getur sáð sér nokkuð en auðvelt að uppræta. Gengur oft undir nafninu bleik melasól.. Afbrigði með fölbleikum og hvítum blómum nefnast Stefánssól. Þau eru sjaldgæf og sennilega það hvítblóma sjaldgæfara.
0203	Papaver radicum* yellow - Melasól*	Fjölær harðgerð íslensk planta. Þrífst best í sendnum jarðvegi en þrífst ágætlega í venjulegri garðamold með gott frárennsli. Getur sáð sér nokkuð en auðvelt að uppræta.
0357	Papaver rhoeas - Deplasól	Sumarblóm. Yrkið 'Pandora'. Blóm í fjölbreyttum ljósum og fjólubláum lit. Hæð allt að 50-60 sm. Blómgast í júlí. Þarf sól og meðalfrjóan jarðveg. Hentar í steinhæðir og blómaengi.
0204	Papaver somniferum - Draumsól	Einær jurt sem verður allt að 120 cm há og blómstrar í júlí og ágúst. Blóm allt að 10 cm í þvermál og blómknúppar áberandi fyrir blómgun. Blómin eru ýmist einföld eða fyllt, gráhvít, fjólublá, bleik, rauð eða tvílit. Þrífst best í sól og sendnum, ekki of frjóum jarðvegi. Hentar t.d. í blómaengi.
0957	Papaver somniferum - Draumsól	Sumarblóm. Fyllt bleik blóm í júlí-ágúst. Þrífst í venjulegri garðamold á sólríkum vaxtarstað. Hægt að sá beint út að snemma að vori
0958	Papaver somniferum - Draumsól	Sumarblóm. Fjólublá einföld blóm í júlí-ágúst. Þrífst í venjulegri garðamold á sólríkum vaxtarstað. Hægt að sá beint úr



		snemma að vori
0959	Papaver somniferum - Draumsól	Sumarblóm. Fyllt rauð blóm í júlí-ágúst. Þrífst í venjulegri garðamold á sólríkum vaxtarstað. Hægt að sá beint úr snemma að vori
0624	Paradisea lilastrum - Paradísarlilja	Hvítblómstrandi fjölær jur. Þrífst best í vel framræstum jarðvegi, má vera kalkríkur, á sólríkum stað. Hæð í kringum 50cm. Blómstrar í júní.
0692	Parthenocissus tricuspidata - Ráðhúsvín	Klifurjurt skyld vínvið, sem vex við flestar aðstæður og skartar afar fögrum haustlitum. Ólíkt bergfléttu, festir hún sig ekki með heftirótum, heldur eins konar límdiskum. Mislíkar oft að vera utandyra allt árið á Íslandi og hentar því oft betur í garðskála o.þ.h. Laufin þrískipt.
0882	Penstemon hartwegii 'Sensation Mix' - Skarlatsgríma	Sumarblóm. Hæð ca 30-50cm blómstöngull. Falleg blómin minna að sumu leyti á lágvaxin fingurbjargarblóm. Ýmsir litir. Þarf að forrækta inni við stofuhita og góða birtu. Sáð í mars. Blómstrar uppúr miðju sumri eða síðsumars, aðeins breytilegt eftir aðstæðum og forræktun.
0960	Penstemon rupicola 'Pink Dragon' - Rósagríma 'Pink Dragon'	Fjölær. Bómstrar bleikum blómum í júní-ágúst. Hæð 15-20 cm. Þrífst í vel framræstum jarðvegi, nokkuð rakaheldum og í meðallagi frjósömum í sól.
0208	Penstemon whippleanus - Kampagríma	Fjölær og nokkuð harðgerð planta, meðalhá (30-40 cm). Dökkpurpurarauð blóm í júlí-ágúst. Sólelsk.
1076	Pericallis x hybrida - Sólblúður	Lágvaxinn þekjuplanta með gulgrænum blómum.
1077	Pericallis x hybrida - Sólblúður	
0737	Petroselinum crispum 'Bravour' - Steinselja 'Bravour'	Matjurt. Kröftug planta sem getur gefið góða uppskeru. Háir stíkar og krulluð blöð.
1044	Philadelphus caronarius - Snækóróna	Hávaxinn skrautrunni. ið er sett í bleyti í 24 klst og í kæli í 30 daga, dreift á yfirborð sáðmoldar, spírun er treg. .
0825	Phlox drummondii - Sumarljómi	Sumarblóm. Viðkvæmur. Hæð 10-15 cm. Þarf sólríkan stað og rakaheldin frjósaman jarðveg. Forsáð inni við stofuhita í mars. Sáð mjög grunnt, ca 1-2mm. Hæð: ca 20-30cm. Best í góðri sól. Ýmsir litir.
0211	Phyteuma charmelii - Klausturstrokkur	Fjölæringur allt að 30 cm á hæð blómstrar fjólubláum/bláum kúlulaga eða egglega blómum í júlí-ágúst. Þrífst best í sól eða hálfskugga í vel framræstri kalkríkri garðamold. Campanulaceae/Bláklukkuætt.
0818	Phyteuma comosum - Huldustrokkur	Hæð 5-15 cm. Blómkollar tiltölulega stórir með rauðfjólubláum blómum sem eru ljósleit neðan til og með víðum poka en pípan er dökkfjólublá efst. Blómgast í ágúst
0961	Phyteuma nigrum - Hrafnastrokkur	Fjölær. Dökkfjólublá blóm með svarta sliktu í júní-júlí. Hæð 20-30 cm . Þrífst í venjulegri garðamold
0212	Phyteuma scheuchzeri - Ígulstrokkur	Allt að 30 cm há upprétt, fjölær jur. Blómin blá/fjólublá og kúlulaga, nokkur saman í hálfkúlulaga blómskipan í júlí og ágúst. Þrífst bæði í sól og hálfskugga og kann best við léttan, kalkríkan vel framræstan jarðveg. Hentar í steinhæðir og í jaðra í fjölæringabeðum.



0761	Phyteuma spicatum, creamy white - Klukkustrokkur, kremhvítur	Fjölær. Hæð 30-60 cm. Blóm kremhvít í júlí. Þrífst í sól eða hálfskugga í næringarríkri létttri vel framræstri og rakaheldri garðmold. Bláklukkuætt/. Campanulaceae
0213	Picea abies - Rauðgreni	Sígrænt, einstofna, beinvaxið barrtré. Hæstu tré hér á landi eru komin yfir 20 metra en erlendis nær fullvaxið tré 40-50m. Getur orðið mörg hundruð ára gamalt. Þarf gott skjól sérstaklega fyrstu árin, hægvoxta og stendur sig oft betur inn til landsins, heldur en við ströndina. Vinsælt sem jólatré og nytjaviður í skógrækt. Frostþol mjög gott, en þol gegn salti og vindum ansi lítið.
0784	Picea omorika - Serbíugreni	Sígrænt tré. Getur orðið nokkuð hátt 10-20 m. Mjóslegin króna. Þrífst best í sól og í léttsum næringarríkum rakaheldum jarðvegi. Þarf skjól. Hætt við haustkali. Þallarætt/ Pinaceae
0884	Picea schrenkiana - Asíugreni	Falleg grenitegund frá Asíu, sjaldgæft að lendi í sitkalús. Vex frekar hægt og betri á skjólgóðum stað.
0218	Picea sitchensis - Sitkagreni	Stórvaxnast grenitrjáa á Íslandi. Til eru yfir 20 metra há tré á Íslandi. Krónan er breið. Ungum trjám er hætt við vorkali en annars er það mjög harðgert. Þrífst best í frjóu landi í sól eða hálfskugga. Hentar ekki í litla garða en er glæsilegt ef það fær nægilegt pláss. Hentar stakstætt, í þyrpingar og er mest ræktaða grenitréð í skógrækt Rétt er að benda á að á Íslandi er víða svo mikið af sitkagreni, sitkabastarði og/eða hvítgreni vaxandi í návígi hvert við annað að víxlfrjóvgun þeirra á milli er algeng. Fyrir vikið er oft erfitt að tala um safnað hér á landi sem hreint sitkagrenis, eða hreint hvítgrenis og má allt eins reikna með að úr sáningu þeirra ja komi bastarður, hvort sem hann kemur til með að bera megin einkenni hvítgrenis (Picea glauca) eða sitkagrenis (Picea sitchensis). Fyrir flesta skiptir þetta líklega ekki öllu máli, en þó er rétt að hafa þetta bakvið eyrað. sem skráð er í bankann sem sitkabastarður er hins vegar af móðurtrjám sem voru bastarðar fyrir og því vitað að niðurstaðan verður sitkabastarður (Picea x Lutzii). Raunar er algengt að hluti þeirra trjáa sem fólk þekkir hér á landi sem sitkagreni, séu í raun sitkabastarðar, enda var nokkuð hér áður fyrr um söfnun og sáningu sitkagrenisja, sem reyndust svo bastarðar. Nánar um allar tegundirnar þrjár og fleiri til hér: https://www.skogur.is/is/nyskograekt/trjategundir-og-trjaheilsa/barrtre/grenitegundir
1018	Picrorhiza kurroa -	Fjölær. Ljós eða fjólublá blóm. Plantan er eitruð.
0962	Pilosella aurantiaca (syn. Hieracium aurantiacum) - Roðafíll	Fjölær jurtt 25-50 cm að hæð. Blómstar rauðgulu til appelsínugulu í júlí - ágúst.
0721	Pinguicula vulgaris - Lyfjagras	Gömul fjölær lækningajurt. 5-10cm há. Blómstrar júní/júlí bláum blómum. Algeng í mólendi.
0745	Pinus contorta - Stafafura	Stafafura er eflaust algengasta furan hér á landi og amk sú duglegasta. Með þessari furu er óþarfi að setja næringarríka mold, því hún myndar góða svepprót og vísbendingar eru um að hún fagni jafnvel samlífi við niturbindandi gerla. Stafafuran vex vel á rýru landi auk þess að hafa gott þol gagnvart frosti og vindum, hún er því ein af bestu trjategundum til gróðursetningar þar sem fátt annað trjákynd getur þrífist. Auk þess er hún auðvitað afar heppilegt jólatré. Stafafuru skal sá afar grunnt.
1073	Pinus sylvestris _ Skógarfura	30-40 cm sumarblóm, meðalstór blóm mörg saman í sveip, tvílit bleik/hvít. Miðjarðarhafsblóm sem hægt er að hafa í potti/köldu gróðurhúsi. spíra á 2- 3 vikum í 18 - 20 gráðu hita.
0885	Pinus thunbergiana - japönsk svartfura	Sérlega vinsælt tré fyrir bonsai og einnig sem garðtré mótað í Niwaki stíl.
0420	Pisum sativum - Grænar	Gráerta eða matarerta (matbaun, en ranglega kallaðar grænar baunir) matjurt af ertublómaætt. Jurtin er stundum ræktuð sem



	baunir/Ertur	skrautplanta, en oftast vegna baunanna (sem eru plöntunnar). Flestir líta á gráertuna sem grænmeti, en frá sjónarhóli grasaðinnar er hún ávöxtur. Utan um ertunnar er svonefndur baunabelgur eða baunaskálpur.
1037	Pisum satvum 'Sugar Pod' - Sykurbaunir	
0222	Plantago maritima * - Kattartunga *	Fjölæringur, íslensk planta. Vex einkum í klettum, einkum sjávarklettum. Algeng um allt land frá láglandi upp í um 600 m hæð.
1083	Poa glauca - Blásveifgras	
0223	Podophyllum (emodi) hexandrum - Maíepli /smeðjuegg	Harðgerður fjölæringur sem hefur reynst vel. Sérkennileg og falleg tegund. Ljósbleik blóm í maí-júní. Verður um 50 cm há. In þurfa að frjósa til að þau spíri. Ávextirnir ekki ætir.
0775	Polemonium caeruleum - Jakobsstigi	Fjölær. Blómstrar fjólubláum/bláum blómum frá lokum júní og fram í ágúst. Hæð 60-90 cm. Þrífst í venjulegri garðamold vel framræstri en rakaheldri í sól eða hálfskugga. Harðgerður og blómviljugur. Getur þurft stuðning. Sáir sér aðeins. Jakobsstigaætt/Polemoniaceae
0693	Polemonium caeruleum alba - Jakobsstigi, hvítur	Blómstrar hvítu upp úr miðju sumri. Oft í kringum 60cm en getur orðið hærri. Þrífst vel í allri garðmold, en vill helst ekki of mikinn skugga. Oft gott að gefa stuðning frá nærliggjandi plöntum, sérstaklega ef er ekki í góðu skjóli.
1045	Polygonum viviparum - Kornsúra	Algeng íslensk jurt.
0634	Potentilla - Mura, gul	Meðal há mura. Blóm einlit gul
0226	Potentilla argyrophylla - Silkimura	Fjölær jurt sem verður um 50-80cm á hæð. Á það til að leggjast út af síðsumars. Blómin sterkgul eða appelsínugul með rauðan blómbotn. Þrífst best í sól og fremur þurrum jarðvegi. Hentar í beð, steinhæðir og kanta. Harðgerð.
0544	Potentilla atrosanguinea - Jarðarberjamura	Harðgerð og falleg planta með lauf sem minna á jarðarberjaplöntur. Blómin rauð, seinni hluta sumars og helst blómgun mjög í hendur við hversu sólríkan stað plantan fær. Helsta ástæða skammlífis er of blautur jarðvegur eða of illa framræstur. Dreifir nokkuð úr sér með stönglum, en sáir sér einnig nokkuð við góðar aðstæður.
0580	Potentilla grandiflora 'Rubra' - Keisaramura 'Rubra'	Keisaramura - fjölær frá Alpafjöllum - 20-35cm - júní-júlí - rauð eða gul blóm - sáning auðveld við 20°C.
0228	Potentilla nitida - Glitmura	Dvergvoxin, fjölær jurt sem verður aðeins um 5 cm á hæð. Myndar með tímanum þéttar breiður. Blómgast í júlí, ágúst. Blómin eru bleik en dekkri í blómbotninn. Til eru hvítblómstrandi einstaklingar. Þrífst best í fremur þurrum, vel framræstum, rýrum jarðvegi. Hentar vel í steinhæðir og einnig sem þekjujurt í beðkanta. Blómstrar meira sunnan heiða en norðan.
0229	Potentilla palustris * - Engjarós *	Fjölær íslensk jurt sem verður um 15-25 cm á hæð. Hefur dumrauð blóm frá júlí og fram eftir sumri. Þrífst best í sól og miklum jarðraka, t.d. í grunnum tjörnum og mýrlendi. Harðgerð jurt.
0963	Potentilla peduncularis - Satínmura	Fjölær jurt 10-20 cm á hæð. Blómstrar gulu í júlí.
1065	Potentilla recta - Glæsímura	Fjölær. Hæð allt að 50 cm. Blómstrar bleik-rauðum blómum í júlí-ágúst. Kýs næringarríkan léttan rakaheldann en vel framræstann jarðveg í sól eða hálfskugga. Harðgerð. Sveipjurtaætt/Apiaceae



0759	Potentilla thurberi 'Monarch' s Velvet' - Dreyramura	Fjölær. Hæð allt að 80 cm. Blóm rauð með dekkri blettum í miðju í júlí-september. Þrífst í sól eða hálfskugga í frekar næringarríkum vel framræstum jarðvegi. Þarf uppbindingu. Harðgerð. Rósaætt/Rosaceae
0766	Potentilla villosa - Loðmura	Fjölær. Hæð 10-20 cm. Blóm gul í júní og fram í júlí. Grágrænt lauf. Þrífst í sól og sendnum vel framræstum jarðvegi. Harðgerð. Rósaætt/Rosaceae
0710	Primula auricula - Mörtulykill	Fjölær jurtt, 10-20cm. Blómstrar fallegum gulum blómum í maí/júní. Sól/hálfskuggi. Meðalrök og frjó garðmold er oftast fín.
0521	Primula denticulata - Kúlulykill	Fjölær. 10-20cm. Blómin saman í kúlu efst á blómstilknum. Blómstrar í maí/júní oftast fjólubláum blómum, en einnig til með hvítum og lillableikum blómum. Sól/hálfskuggi. Meðalrök og frjó garðmold, vel framræst sem þornar ekki auðveldlega. Vill gott skjól og jafnvel vetrarskýlingu. Þrífst því oft betur þar sem snjór er algengur. Oft skammlíf annars staðar.
0231	Primula elatior - Huldukyll	Fjölær jurtt sem verður um 20-30cm á hæð. Tegundin myndar upprétta blaðhvirfingu sem legst smám saman útaf þegar líður á sumarið. Upp úr hvirfingunni stendur blómstilkur sem ber gul eða ljósgul blóm með grænleitri miðju. Lykillinn þrífst best í sól og frjóum og hæfilega rökum jarðvegi. Hentar í frjóar steinhæðir, fjölæringabeð og kanta.
0767	Primula elatior pink - Huldukyll bleikur	Fjölær. Hæð 15-25 cm. Blóm bleik í apríl-júní. Þrífst í sól eða hálfskugga í næringarríkri vel framræstri og rakaheldri etv. aðeins kalkríkri garðamold. Mariulykilsætt/Primulaceae
0541	Primula florindae - Friggjarlykill	Friggjarlykill er stærstur lykla sem ræktaðir eru hér á landi og geta blómstönglar farið yfir metershæð. Blómin bjöllulaga og saman í sveipum. Harðgerður og auðræktanlegur, kýs helst raka og frjóa mold.
0964	Primula florindae var rubra - Friggjarlykill, rauður	Fjölær. Friggjarlykill er stærstur lykla sem ræktaðir eru hér á landi og geta blómstönglar farið yfir metershæð. Blómin bjöllulaga og saman í sveipum. Harðgerður og auðræktanlegur, kýs helst raka og frjóa mold.
0965	Primula ioessa - Klukkulykill	Fjölær. Hæð 20-30 cm. Blóm hvít til fjólublá í júlí. Þarf sólríkan vaxtarstað. Þolir hálfskugga. Þrífst best í rökum og næringarríkum jarðvegi. Þolir illa að þorna. Hentar í fjölæringabeð og í steinhæðir.
0232	Primula latifolia - Límlykill	Fjölær og harðgerð jurtt. Verður um 10-30 cm á hæð. Stinn lauf í hvirfingu við jörðu og upp úr henni vex trjákenndur blómstöngull sem ber fjólublá eða rauðblá blóm í maí-júní. Þarf sól eða hálfskugga og þrífst best í frjóum jarðvegi. Hentar í steinhæðir, beð og kanta, jafnvel sem undirgróður.
0233	Primula scotica - Skotalykill	Fjölær smávaxin og fínleg jurtt. Blaðhvirfingin er aðeins um 4-8 cm á hæð. Blómstönglarnir bera 1-6 bleik/bleikpurpura blóm með gulu auga ofan við blaðhvirfinguna og eru 15-20 cm háir. Verður oftast fremur skammlíf. Þarf sól og léttan, frjóan jarðveg. Hentar vel í steinhæðir en einnig framarlega í blönduð fjölæringabeð.
0581	Primula veris - Vorlykill (sifjarlykill)	Vorlykill (sifjarlykill) - fjölær evrópsk engajurt - 15-30cm - maí - gul blóm - sáning auðveld, sáir sér út.
0966	Primula vulgaris - Laufeyjarlykill	Fjölær. Hæð 15-20 cm. Blóm ljósgul í maí. Þrífst í frjóum rakaheldum jarðvegi sem er vel framræstur og ekki of súr. Sól eða hálfskuggi.
0770	Primula vulgaris hybrid - Laufeyjarlykill, blendingur	Fjölær. Hæð 15-20 cm. Blóm rauð/bleik í apríl-júní. Þrífst í sól eða hálfskugga í næringarríkri vel framræstri og rakaheldri etv. aðeins kalkríkri garðamold. Harðgerð planta en getur verið skammlíf. Mariulykilsætt/Primulaceae
0762	Primula waltonii x florindae - Völtulykilsblendingur	Fjölær. Hæð 40-50 cm. Blóm purpuralit í júní-júlí. Þrífst best í sól eða hálfskugga í næringarríkri rakaheldinni og vel framræstri garðamold. Harðgerð planta. Mariulykilsætt/Primulaceae



0967	Primula x pruhoniana 'John Mo' - Elínarlykill 'John Mo'	Fjölær. Hæð 15-20 cm. Blóm fölgul í apríl-maí. Þrífst í léttum næringarríkum og rakaheldum jarðvegi sem er vel framræstur. Kýs sól en þolir vel hálfskugga.
0631	Primula x pubescens mix - Frúarlykill mix	Fjölæringur, þolir hálfskugga. Blómgast í júní, verður 10-20 cm há. Skipta má þeim á vori eða að hausti. Getur smám saman myndað breiður. jur. Harðgerð og auðræktuð planta. Algengur blómlitur mólilla – engu að lofa um liti úr þessari blöndu.
0601	Prunella vulgaris - Blákolla	Blákolla - fjölær jur um allt Norðurhvel - 5-30cm - júlí, bláleit blómöx. Sáð við 20°C að vori. Hafi ekki spírað á 3-4 vikum gæti borgað sig að setja sáðilátið í kulda (-4 til 4°C) í tvær til fjórar vikur. Fara svo aftur á byrjunarreit.
0237	Pulsatilla alpina - Fjallabjalla	Fjölær jur sem verður um 20-45 cm á hæð. Blómin eru hvít með purpurbláum tón. Miðjan er gul. blómin eru 4-6 cm breið og upprét. Kýs bjartan stað og kalkrýkan jarðveg. Hentar í fjölæringabeð og í steinhæðir.
0238	Pulsatilla alpina ssp apiifolia - Glóbjalla	Fremur hægvoxta fjölæringur sem verður um 20-45 cm hár með tímanum. Blómin fölgul/brennisteinsgul í maí-júní. Þau eru upprétt eða því sem næst og um 4-6 cm í þvermál. Hefur reynst harðger í steinhæðum og blómabeðum. Þarf þurran sandmalar-jarðveg og gott skjól fyrir vetrarvætu/gott frárennsli. Ranunculaceae/ Sóleyjaætt. Plöntur af sóleyjaætt eru allar að einhverju leyti eittraðar en mis mikið. Samheiti Anemone alpina ssp. apiifolia
0239	Pulsatilla bungeana - Dvergabjalla	Fjölær, lágvaxin jur, aðeins 5-8 cm á hæð. Blómin upprétt og bjöllulaga, bláfjólublá að lit. Standa vel upp úr laufmassanum. Þrífst best í steinhæðum eða í fremst í blómabeðum.
0241	Pulsatilla halleri - Heiðabjalla	Fjölæringur, harðger. Hæð 15-45 cm. Blóm fjólublá/gráfjólublá í maí-júní. Þrífst best í sól og kalk- og næringarríkum jarðvegi sem er vel framræstur. Hentar í steinhæð.
0644	Pulsatilla halleri ssp. Grandis - Heiðabjalla, stórbómstrandi	Fjölært blóm af sóleyjaætt. Blómin eru bjöllulaga og fjólublá. Fjölær jur, allt að 15 sm há þegar hún blómstrar. Stönglarnir hafa lengst í 45 sm þegar aldinin hafa þroskast. Góð í skraut- eða steinhæðabeð.
0712	Pulsatilla rubra - Kálfabjalla	Kálfabjöllur blómstra að vori fallegum rauðpurpura lituðum bjöllublómum. Einnig til í rauðum með brúnum eða svörtum tönnum. Vill léttan og vel framræstan jarðveg, en ágætt að sé nokkuð húmúsríkur. Blómstrar best í fullri sól. Oft 20-30cm há en getur orðið hærri.
0625	Pulsatilla violacea - Fjólubjalla	Fjólubjalla er fjölæringur með ljós- purpuralit blóm snemma sumars. Verður 20-30 cm há. Blómin koma á undan laufunum snemma vors. Upprunnin í Kákasus-fjöllum. Líkar best við sendinn og frjóan jarðveg.
0776	Pulsatilla vulgaris - Geitabjalla	Fjölær. Hæð allt að 40 cm. Blóm fjólublá í maí-júní. Þrífst í sól og frjóum rakaheldum jarðvegi. Þarf gott frárennsli. Harðgerð. Sóleyjaætt/Ranunculaceae. Plantan er eitruð.
0242	Pulsatilla vulgaris 'Rote Glocke' - Geitabjalla 'Rote Glocke'	Fjölæringur, harðger. Hæð 20-40 cm. Blóm fjólublá í maí-júní. Þrífst best í sól og sendnum næringarríkum vel framræstum jarðvegi. Hentar í fjölæringabeð og steinhæð.
1014	Pyracantha coccinea - Eldþyrnir	Lauffellandi runni.
0243	Pyrola minor* - Klukkublóm *	Fjölæringur, harðger. Hæð 7-18 cm. Blóm hvítleit og bleik í júlí-ágúst. Þrífst best í sól og rökum næringarríkum jarðvegi.
0245	Ramonda myconi - Klettadiskur	Fjölæringur. Þarf sólríkan vaxtarstað. Þarf vetrarskýlingu. Þrífst best í næringarríkum, vel framræstum jarðvegi. Hentar í steinhæðir. Fjólublá blóm í júní-júlí. Verður um 10 cm há.
0969	Ranunculus acris - Brennisoley*	Fjölær jur. Blómstrar gulu



0124	Ranunculus parnassifolius - Kalksóley	Harðgerð. Þrífst vel í rökum jarðvegi á sólríkum stað. Getur sáð sér. Hvít blóm í júní-júlí.
0608	Ranunculus platanifolius - Hlynsóley	Fjölær hávaxin planta sem verður nokkuð mikil um sig. Laufið er stórt og minnir á hlynlauf. Blómin mörg saman, hreinhvít, en knúpparnir rauðleitir. Byrjar að blómstra í lok maí og stendur í blóma fram í júlí. Harðgerð og auðræktuð, vex í sól eða hálfskugga í venjulegri garðmold.
0426	Raphanus sativus ' French breakfast' - Radísur	Matjurt. Radísur fljótsprottnar og auðræktaðar.
0736	Raphanus sativus - Radísa 'Cherrie Belle'	Matjurt. Fallegar rauðar, kringlóttar radísur.
0421	Raphanus sativus - Radísur	Matjurt. Sá inni frá mars og fram í apríl – sá úti frá miðjum apríl og fram að júlí. Sá oft t.d með tveggja-þriggja vikna millibili en ekki miklu í einu. Má sá á milli raða annarra plantna sem eru seinsprottnar. Radísur ýta hver annarri frá og þarf ekki mikið að grisja enda þægilegt að sá þeim því in eru stór.
0248	Rhinanthus minor * - Lokasjóður *	Fjölæringur. Einnig kallað peningagrass. Meðalstór jurt af grímublómaætt, algengur á láglandi um land allt. Hann vex í graslandi, flögum og mólendi. Aldinið er í lögun eins og peningur. Hæsti fundarstaður er í 700m hæð í Efri-Kisubotnum austan í Kerlingarfjöllum.
0250	Rhodiola semenowii - Skessuhnoðri/Skessusvæfla	Fjölæringur. Hvít eða gul blóm með gulrauðu hýði í júní-júlí. Nær 30-50 cm hæð. Þarf sólríkan stað. Þrífst best í sendnum, rýrum og vel framræstum jarðvegi. Hentar í steinhæðir og beð.
0508	Rhododendron ferrugineum - Urðalyngrós	Lyngrós. Fjölær, sígrænn runni, hægvoxta. Verður allt að 1,5m á hæð. Djúpleik blóm í júlí. Þarf súran jarðveg og gott skjól, jafnvel vetrarskýli.
0254	Rhododendron myrtifolium - Klettalyngrós	Lyngrós, sígrænn runni. Hæð allt að 50 cm. Bleik blóm að vori eða snemmsumars. Þrífst best í hálfskugga og frekar súrum léttum lífefnaríkum velframræstum meðal rökum jarðvegi. Þarf frekar skjólríkan stað.
0256	Ribes alpinum - Fjallarifs	Lauffellandi runni, harðger. Blóm gulgræn í júní. Hæð 1-1,5 m. Þrífst best í sól eða hálfskugga í meðal rökum og næringarríkum jarðvegi. Sérbylisplanta.
0970	Ribes glandulosum - Kirtlirifs	Lauffellandi jarðlægur, þekjandi runni. Laufgast í lok apríl – maí. Rauðir haustlitir. Blómin gulgræn í klösum. Lítt áberandi. Rauð æt rifsber þroskast strax í ágúst. Skuggþolið.
0971	Ribes laxiflorum - Hélurifs	Berjarunni. Hæð allt að 50 cm. Blóm bleik í júní-júlí. Berin blásvört, æt. Rauðir og rauðfjólubláir haustlitir. Skuggapolinn. Útbreitt vaxtarlag og jarðlægur greinar geta skotið rötum.
0596	Ribes nigrum - Sólber	Sólberjarunni - berjarunni af ræktunaruppruna - 100cm - maí - gulleit blóm - svarblá ber í ágúst. Best að sá í potta utandyra að hausti. Planta svo út haustið á eftir. Finn berjarunni í skógrækt - fyrir fuglana - en sjaldan skila sáðplöntur af berjarunnum eftirsóknarverðum gæðum, sé miðað við útvalin græðlingayrki.
0258	Ribes spicatum (syn. Ribes rubrum) - Garðarifs, rifs	Lauffellandi berjarunni, algengasta rifsplantan. Garðarifs eða rifs getur sáð sér og þrífst vel, berjauppskera mismunandi mikil eins og gerist hjá villiplöntum. Blómin grænleit til rauðleit að vori. Þarf að grisja.. (syn. Ribes rubrum)
0539	Ribes spicatum 'Weisse	Rauð hollensk er gamalreynt yrki sem hefur verið í ræktun á Íslandi frá a. m. k. um 1830 með góðum árangri. Algengasta



	Göteborger' op - Hvítrífs 'Weisse Göteborger' op	rifstegund hérlendis. Yrkið er upprunnið í Hollandi, kom fram fyrir 1729. Þetta er eitt elsta ef ekki elsta yrkið sem þekkt er. Plantan er stór, kröftug, upprétt, þétt, myndar mikið af berjum. Hefur mikinn viðnámsþrótt gegn sjúkdómum.
0259	Ribes uva crispá 'Hinnomaki Röd' - Stíkilsber, rauð	Fjölær runni. Harðgerður en þarf skjól eigi hún að gefa árvissa uppskeru. Stór græn ber sem eru best eftir næturfrost að hausti.
0900	Rosa '1717' op - Beðrós, margir litir	Beðrós, margir litir. 2020 (Prairie Mix #1) frá Kanada. Nýpa.
0901	Rosa '1740' op - Beðrós, margir litir	Beðrós, margir litir. 2020 (Prairie Mix #2) frá Kanada. Nýpa.
0902	Rosa '1901' op - Beðrós, margir litir	Beðrós, margir litir. 2020 (Prairie Mix #3). frá Kanada. Nýpa.
0903	Rosa '1920' op - Beðrós, margir litir	Beðrós, margir litir. 2020 (Prairie Mix #4) frá Kanada. Nýpa.
0904	Rosa 'Agnes Victoria' op - Beðrós, margir litir	Beðrós, margir litir. 2020. frá Kanada. Nýpa.
0722	Rosa amblyotis - Hverarós	Rós upprunnin við Kamchatka. Þrífst almennt vel hér á landi. Harðger. Blómstrar rauðum til bleikum einföldum blómum í júlí/ágúst. Getur þroskað nýpur. Vel framræstan og ekki of þurran jarðveg, nokkuð frjóan, í sól. Nýpa.
1024	Rosa 'Best Yellow (Rosa x 239 OP)' op - Beðrós margir litir	Beðrós, margir litir. frá Kanada 2022 . Nýpa.
0487	Rosa 'Campfire' Fresons op. - Beðrós, margir litir	Beðrós. Margir litir. Open pollinated . frá Kanada 2019 Nýpa.
0486	Rosa 'Centennial' op. - Beðrós, margir litir	Beðrós. Margir litir. Open pollinated .Nýpa.
0635	Rosa davidii 'Fenja' op - Davíðsrós 'Fenja'	Davíðsrós. Runnarós. Bleik blóm með daufan ilm í júní-júlí. Rauðar nýpur í september. Virðist harðgerð. Nýpa.
1032	Rosa 'Doug Wild's BY 14' - Beðrós margir litir	Beðrós, margir litir. frá Kanada 2022 . Nýpa.
1025	Rosa 'Doug Wild's BY 16' - Beðrós margir litir	Beðrós, margir litir. frá Kanada 2022 . Nýpa.
1028	Rosa 'Doug Wild's BY 18' - Beðrós margir litir	Beðrós, margir litir. frá Kanada 2022 . Nýpa.
1031	Rosa 'Doug Wild's climber' - Beðrós margir litir	Beðrós, margir litir. frá Kanada 2022 . Nýpa.
0713	Rosa elliptica - Keilurós	Villirós upprunnin í mið-Evrópu. Harðger. Getur náð 2m hæð. Blómstrar mest í sól en getur verið í hálfskugga. Vill ekki of blautan jarðveg og er hrifin af kalkríkum jarðvegi. Blómstrar bleiku. Getur þroskað nýpur. Nýpa.
0972	Rosa 'Eos' op - Beðrós 'Eos'	Móðurrós, einföld rauð, nýpa
0481	Rosa 'Fresons' - Beðrós, margir litir	Beðrós. Margir litir. Open pollinated frá Kanada 2019. Nýpa



1029	Rosa 'Gay Centennial' op - Beðrós margir litir	Beðrós, margir litir. frá Kanada 2022 . Nýpa.
0907	Rosa 'Kelowna Coral' op - Beðrós, margir litir	Beðrós, margir litir. 2020. frá Kanada. Nýpa.
0617	Rosa 'Lac La Nonne' op - Eðalrós 'Lac La Nonne'	Eðalrós - garðakynblendingur - um 60-80cm - afkomendur verða af ýmsu tagi. Kaldörvun við 4°C í 16 vikur, svo sáð við 20°C. Gæti komið á óvart - eiginleikar foreldra erfast ójafnt! Nýpa.
0490	Rosa 'Lac Majeau' op. - Beðrós, margir litir	Beðrós. Margir litir. Open pollinated .Nýpa.
0613	Rosa Marzipan/Marsipaani op - Eðalrós 'Marzipan'	Eðalrós - garðakynblendingur - um 60-80cm - afkomendur verða af ýmsu tagi. Kaldörvun við 4°C í 16 vikur, svo sáð við 20°C. Gæti komið á óvart - eiginleikar foreldra erfast ójafnt! Nýpa.
1040	Rosa Moyeii, Hemsl & Wilson - Meyjarós	Rósarunni sem vex í tempruðu svæðum Tíbet og mið Kína. Þarf kaldörvun í nokkra mánuði.
0261	Rosa moyesii - Meyjarrós	Fjölær rósattegund. Bleik, einföld falleg t.d. upp við vegg, þolir skugga en blómstrar meira í sól. Fínleg blöð, rauð aldin á haustin. Harðgerð.Nýpa.
0262	Rosa moyesii 'Geranium' - Meyjarrós 'Geranium'	Rósaætt, lauffellandi runni sem kys sól. Skarlatsrauður og verður milli 180-250 cm á hæð. Mjög harðger og hentar í litla garða.Nýpa.
1027	Rosa 'Never Alone (NA)' op - Beðrós margir litir	Beðrós, margir litir. frá Kanada 2022 . Nýpa.
0491	Rosa 'Never Alone' op. - Beðrós, margir litir.	Beðrós. Margir litir. Open pollinated . frá Kanada 2019. Nýpa.
0973	Rosa nitida 'Dart's Defender' op - Brúðurós 'Darts Defender' op	Beðrós, 1,5 m að hæð. Blóm hálfyllt bleik. Nýpa
0263	Rosa nutkana - Strandrós	Villirós. Uppréttur runni sem verður allt að 150 sm hár eða hærri og 90-120 sm breiður, einblómstrandi. Blómin oftast stök, rósbleik-lillableik, 5-6cm breið, ilma mikið.Kelur ekkert, blómstrar mikið, er óhemju skriðul.Nýpa.
1030	Rosa 'Olds College (OC)' op - Beðrós margir litir	Beðrós, margir litir. frá Kanada 2022 . Nýpa.
1033	Rosa 'Oscar Peterson (OP)' op - Beðrós margir litir	Beðrós, margir litir. frá Kanada 2022 . Nýpa.
0910	Rosa 'Oscar Peterson' op - Beðrós, margir litir op	Beðrós, margir litir. 2020. frá Kanada. Nýpa.
0911	Rosa 'Oscar Peterson' op op - Beðrós, margir litir op op	Beðrós, margir litir. 2020. frá Kanada. Nýpa.
0492	Rosa 'Oscar Peterson' op. -	Beðrós. Margir litir. Open pollinated . 2019. Nýpa.



	Beðrós, margir litir	
0609	Rosa rugosa 'Moje Hammerberg' - Ígulrós 'Moje Hammersberg'	Rósarunni, lauffellandi. Blómin rauðbleik, hálfyllt ilmandi. Harðgerð planta.Nýpa.
0266	Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup' - Ígulrós 'Dagmar'	Lauffellandi runni, uppréttur, 30-80cm hár. Bleik blóm. Rótektta, frost- og saltþolin. Þarf að snyrta/klippa á vorin.Nýpa.
0974	Rosa rugosa 'Hansa' op - Hansarós	Beðrós, 1,5 m að hæð. Nýpa
0260	Rosa setipota - Burstarós	Runnarós, oft um 2m há en getur orðið hærri. Best í hóflega rakri, frjórri garðmold. Gott frostþol. Blómstrar dökkbleikum einföldum blómum í júlí/ágúst. Þolir hálfskugga. Mjög lítið um þyrna.Nýpa.
0630	Rosa x malyi 'Kempeleen Kaunotar' op -Fjallarósablendingur	Finnskur rósarunni, gróskumikill og blómsæll. Hentar vel í stóra garða, útivistarsvæði og jafnvel í skjólbelti. Blómstrar betur en flestar fjallarósir í Yndisgarðinum á Reykjum. Er blendingur milli R. majalis og R. pendulina. Framboð takmarkað, ekki í almennri framleiðslu. Nýpa.
0483	Rosa x mix. - Beðrós, margir litir	Beðrós. Margir litir. Open pollinated .Nýpa.
0271	Salvia hians - Kasmírsalvía	Harðgerð fjölær planta. Hæð 50-85 cm. Blóm bláfjólublá með hvítum flekkjum. Blómgast í júní-júlí. Þrífst í sól eða litlum skugga og frekar rakaheldum en vel framræstum jarðvegi sem er léttur og næringarríkur. Lamiaceae/Varablómaætt.
0582	Sambucus callicarpa - Alaskayllir	Alaskayllir - runni frá Alaska - 100-300cm - maí-júní - hvítir blómskúfar, rauð ber í júlí-ágúst - kaldörvun við 4°C í átta vikur.
0514	Sambucus racemosa ssp. Pubens - Dúnyllir	Blómstrandi runni. Blómstrar hvítum eða gulum blómum í júní/júlí og myndar svo rauð ber í framhaldinu. Berin valda magakveisu í mannfólki, en fuglar eru hrifnir af þeim. Harðger runni sem þarf ekki fulla sól og þrífst oft ágætlega í skugga líka. Fullorðinn runni er oft 2-4metra hár.
0272	Saussurea kurilensis - Eyjaskjanni	Körfublómaætt. Blóm blá/fjólublá.
0765	Saxifraga - Steinbrjótur	Fjölær. Hæð 15-20 cm. Blóm hvít með rauðum doppum, blómstönglar 30-50 cm háir. Blómgun júní-júlí. Þrífst í sól og vel framræstum léttum jarðvegi. Steinbrjótsætt/Saxifragaceae.
0273	Saxifraga callosa - Tungusteinbrjótur	Steinbrjótsætt, fjölær jurt sígræn. Blóm eru hvít og jurtin milli 15 og 40 cm. Hentar í steinhæðir.
0975	Saxifraga cuneifolia - Rökkursteinbrjótur	Fjölær þekju- og steinhæðarplanta. Lágvaxinn en allt að 20 cm með blómum. Blóm hvít í júní-júlí. Þrífst vel í hálfskugga og þurrum rýrum jarðvegi.
1022	Saxifraga hirculus* - Gullbrá*	Fjölær íslensk planta. Lágvaxin. Blóm gul með rauðum dröfnum neðarlega á krónublöðunum.
0066	Saxifraga hypnoides var. luteo-virens - Þórsmerkursteinbrjótur	Fjölæringur, íslensk jurt. Hæð 10-20 cm. Fölgul, gul eða gulgræn blóm í júní. Þrífst í dálítið sendinni venjulegri garðamold í sól og nokkru skjóli. Harðger.
1021	Saxifraga koschy	Fjölær. Þúfu myndandi steinbrjótur. Hæð 3-5 cm. Blóm 3-5 cm á hæð, skærgul í júní-júlí. Þrífst í sól og kalkríkum, grýttum vel framræstum jarðvegi.
0764	Saxifraga oppositifolia* - Vetrarblóm/Vetrarsteinbrjótur*	Fjölær. Hæð 5-20 cm. Blómstrar bleikum blómum í apríl-maí. Þrífst í sól og þurrum sendnum frekar rýrum jaðvegi. Hægvaxta en myndar með tímanum þúfu. Harðgerð planta. Steinbrjótsætt/Saxifragaceae



0546	Saxifraga X arendsii - Roðasteinbrjótur	Harðgerður og frekar lágvaxinn steinbrjótur sem líður best í sól, eða þá hálfskugga og í þurrum, rýrum jarðvegi. Mikið notaður til að mynda breiður í steinhæðum. Ýmis yrki til og blómlitur ýmist rauður, hvítur eða í bleikum tónum þar á milli. Hæð blómstöngla sjaldan yfir 15-20cm.
0715	Saxifraga x urbium - Postulínsblóm	Fjölær jurtt af steinbrjótsætt. Blendingur skuggasteinbrjóts, líkist honum mjög og oft ruglað við hann. Blómstrar hvítum blómum með rauðum doppum megnið af sumrinu. Finnst oft í steinhæðum, en er einnig kátur með heldur rakari jarðveg í sól og hálfskugga. Blómstíklar oft 15-30cm.
0976	Scabiosa columbaria f. nana 'Pincushion Pink' - Systrakarfa	Fjölær. Harðgerð og blómviljug. Hæð 25-30 cm. Ljós bleik blóm í júlí og fram á haust. Þrífst í sól og venjulegum garðajarðvegi.
0520	Scabiosa japonica var. Alpina - "karfa" án íslensks tegundaheitis	Fjölæringur sem blómstrar langt frameftir sumri. 20-30cm hátt. Blómstrar ljósbláum eða ljósfjólubláum blómum. Best í sól í venjulegum garðjarðvegi, þó vel framræstum og jafnvel þurrum.
0805	Scilla hispanica/Hyacinthoides hispanica - Spánarklukkulilja/Spánarlilja, blá	Fjölær laukplanta. Hæð 20-30 cm. Blómstrar bláum blómum í maí-júní. Þrífst í næringarríkum léttum rökum en vel framræstum jarðvegi í sól eða hálfskugga. Aspasætt/Asparagaceae
0841	Scrophularia nodosa - Hnúðrót	Hávaxin (60-80 cm háir stönglar). Blómin lítil og dökkrauðbrún. Harðgerð, þrífst ágætlega í Lystigarðinum á Akureyri. Gömul og merkileg lækningajurt.
0278	Sedum kamtschaticum/loriferum - Stjörnuhnoðri	Hnoðraætt. Fjölær jurtt rauðgul og er milli 15 og 30 cm á hæð. Hentar í hleðslur, kanta, steinhæðir, beð og sem undurgróður.
0977	Sedum reflexum - Berghnoðri	Fjölæringur. Mjög harðgerð, jarðlæg þekjuplanta sem blómstrar gulum blómum í ágúst. Getur vaxið í sól eða skugga.
0978	Sempervivum tectorum - Húslaukur	Fjölær. Sígrænn þekjuhúslaukur, 15-20 cm á hæð. Blóm í rauðbleikum lit í júlí-ágúst. Þrífst best í sendnum og vel framræstum jarðvegi í sól.
0279	Senecio fluviatilis - Vætupulur	Gul blóm. Um það bil 1 meter á hæð.
0812	Senecio Polyodon - Ekki með íslenskt nafn	Fjölær. Lítil reynsla. Gæti verið viðkvæm hér á landi og ekki lifað mörg ár, jafnvel orðið einær. Blómstrar á fyrsta ári og því að lágmarki hægt að hafa sem sumarblóm. Blómstrar duglega, fallega bleik-fjólubláum blómum síðsumars.
0515	Silene alpestris - Fjallaholurt	10-20cm hár fjölæringur sem blómstrar snjóhvítum blómum í júní/júlí. Harðger og vill helst léttan jarðveg í sól. Getur verið skriðul.
0281	Silene asterias - Stjörnuholurt	Caryophyllaceae ætt. Hárauð blóm, 80-100 cm. á hæð. Hentugt í skrautblómabeð.
0842	Silene dioica - Dagstjarna	Í hópi fjölrærra hjartagrása. Algeng garðjurt. Dagstjarna er „sérbylisplanta“, þ.e. sumar plöntur bera eingöngu kvenblóm, aðrar aðeins karlblóm. Kvenplönturnar mynda ógrynni af i og sá sér út um allt. Garðeigendur kjósa því frekar karlplöntur er þess er kostur. Blómstrar yfir sumartímann
0282	Silene uniflora * - Holurt *	Caryophyllaceae ætt. Hvít blóm, 10-25 cm. á hæð. Vex í sendinni jörð. Hentugt í steinhæðir, beð, hleðslur. Einnig þekkt sem pungagras, fálkapungur, melapungur, galtarpungur o.fl. á íslensku. Samheiti á latínu er Silene maritima og danskt heiti er Strand Limurt.



0283	Sisyrinchium angustifolium - Blómaseymi	Sverðliljuætt. Blá blóm, 15-45 cm á hæð. Fjölær jurtt. Hentar í steinhæðir og fjölæringabeð.
0176	Sisyrinchium littorale - Strandseymi	Fjölær jurtt um 40-50cm há, blómstrar fjólubláum blómum í maí/júní. Kýs sendinn en rakan jarðveg í sól.
0175	Sisyrinchium patagonicum - Seymitegund: íslenskt heiti ekki til	Fjölær við góð skilyrði, en oft skammlíf hér á landi ef raki er of mikill. Harðger hvað kulda varðar, en þarf mjög vel framræstan jarðveg sem stendur ekki lengi blautur. Blómstrar fallega gulum blómum snemma sumars.
0821	Skrautgrös	Ýmis skrautgrös
0621	Soldanella montana - Fjallakögurklukka	Fjallakögurklukka - klettajurt frá fjöllum Evrópu - 15-20cm - maí/júní, ljósbláfjólubláar blómklukkur. Sáð við 20°C í 4 vikur, svo flutt í kalt (-4 til 4°C) í 4-6 vikur, síðan í 5-12°C sé spírun léleg eða óregluleg. Þarf vel framræstan skriðujarðveg.
1043	Solidago canadensis - Kanadagullhrís	Lífleg, gulblómstrandi, harðgerður fjölæringur, jum sáð að vori að undangenginni kaldörvun í 60 daga, junum þrýst ofan í sáðmoldina en þau ekki hulin.
1015	Sorbus alnifolia - Ölnureynir	Lauffellandi tré. Hæð 9-15 m. Nokkuð harðger. Hvít ilmandi blóm í júní - júlí. Bleik ber og fallegir haustlitir.
0565	Sorbus Americana - Knappareynir	Fremur smávaxið tré, ætti að geta náð a.m.k. 10 m héraendis, einstofna með misbreiða krónu. Tegundin líkist mjög reyniviði og æxlast þær vel saman. Dregur úr vexti þegar blómstrun byrjar. Tiltölulega lítil reynsla héraendis en lofar góðu.
0287	Sorbus aucuparia - Ilmreynir	Rósaætt, lauffellandi tré. Rjómahvítur litur, 10-14 metrar á hæð. Hentar í skjólbelti, jafnvel limgerði.
0285	Sorbus aucuparia 'Autumn Spire' - Ilmreynir 'Autumn Spire'	Rósaætt, lauffellandi tré. Rjómahvítur litur, 10-14 metrar á hæð. Hentar í skjólbelti, jafnvel limgerði.
0291	Sorbus cashmiriana - Kasmírreynir	Rósaætt, lauffellandi tré. Bleikhvítur litur, 4-6 metrar á hæð. Hentar í raðir og þyrpingar.
0292	Sorbus commixta - Fjallareynir	Rósaætt, lauffellandi tré. Hvítur litur, allt að 7 metrar á hæð. Hentar í þyrpingar, skrautrunnabeð og í litla garða. Flottir haustlitir.
0297	Sorbus frutescens - Koparreynir	Rósaætt, lauffellandi runni. Hvítur blómlitur og hvít ber að hausti. Fallegir haustlitir. Verður allt að 2,5 metrar á hæð. Hentar í skrautbeð.
0298	Sorbus hostii - Úlfareynir	Rósaætt. Bleik blóm. Hæð 2-3 metrar. Rauð ber. Gulir haustlitir.
0500	Sorbus meinichii - Strandreynir	Breytileg reynitegund, sem talinn er blendingur ilmreynis og gráreynis. Sjaldan hærra en 4metrar. Bestur á sólríkum stað, í sæmilega rökum og frjóum jarðvegi.
0498	Sorbus munda - Perlureynir	Lítið tré eða runni sem nær allt að 6metra hæð. Kýs frjóan vel framræstan jarðveg. Best í sól. Hvít ber.
0308	Sorbus sp. - Reynir (ógreindur)	Lauffellandi tré eða runni - aðrar upplýsingar liggja ekki fyrir
0309	Sorbus vilmorinii - Kínareynir	Lauffellandi smátré, 4-6m hár, margskipt lauf, hvít/fölbleik blóm, kóralbleik/fölbleik ber.
0310	Sorbus x ambigua (x erubescens) - Bergreynir	Lauffellandi tré - um 3m hár, heil mjúktkennt lauf, bleik blóm, rauð ber
0789	Spiraea hayatana - Kvistur án ísl. heitis	Runni ættaður frá Taiwan sem verður um það bil 60-100 cm á hæð. Blóm hvít með rauðri/dökk bleikri miðju. Þrífst best í sól eða hálfskugga og venjulegri garðamold. Lítil reynsla.



1074	Spirea hayatana _ Háfjallakvistur	30-40 cm sumarblóm, meðalstór blóm mörg saman í sveip, bleik. Miðjarðarhafsblóm sem hægt er að hafa í potti/köldu gróðurhúsi. spíra á 2- 3 vikum í 18 - 20 gráðu hita.
0699	Stachys macrantha - Álfakollur	Harðger, fjölær jurtt. Lauf nokkuð hjartalaga. Blómstönglar í kringum 50cm háir, blómin rauðpurpura í ágúst. Léttur jarðvegur í sól eða hálfskugga.
0717	Succisa pratensis - Stúfa (púkabit)	Fjölær jurtt, oft í kringum 20-30cm, blómstrar ljósfjólubláum blómum í júlí/ágúst. Vex villt syðst á landinu.
0313	Symphoricarpos albus - Snjóber	Skriðull lauffellandi hálfrunni, um 80-100cm hár, fölbleik blóm, hvít ber sem standa langt fram á vetur, hentar best í deigt skóglendi og þar sem hann má þvælast um allt.
0980	Synthyris stellata - Stjörnulauf	Fjölær jurtt 10-20 cm há. Blómstrar bláfjólubláum klukkulaga lútandi blómum í apríl-maí. Myndar fallegar blaðhvirfingar. Hálfskuggi til skuggi. Harðger
1078	Tagetes Cresto Yellow - flaelisblóm	
0769	Tagetes patula - Flauelsblóm	Sumarblóm. Hæð 15-20 cm. Blómstrar mikið. Þarf gott frárennsli og sól. Þolir ekki frost. Körfublómaætt/Asteraceae.
1042	Tanacetum Coccineum - Biskupsbrá, ljósfjólublá-fyllt	Biskupabrá fyllt ljósfjólublá Glæsilegur fjölæringur, þarf oft stuðning. ið er ekki hulið við sáningu, spírar á 14-21 degi við 20°C.
0806	Tanacetum coccineum - Biskupsbrá, „Eilíen May Robinson“	Fjölær. Hæð 60-75 cm. Blóm fölbleik með gulri miðju í júlí-ágúst. Þrífst í sól og næringarríkum vel framræstum léttum jarðvegi. Þarf stuðning. Harðgerð. Körfublómaætt/Asteraceae
0607	Tanacetum coccineum - Biskupsbrá, ljósbleik. Fyllt	Fjölæringur, harðgerð. Blóm fyllt ljósbleik í júlí-ágúst. Hæð 60-80 cm, þarf stuðning. Þrífst best í sól og næringarríkum jarðvegi vel framræstum. Körfublómaætt/Asteracea
0981	Tanacetum coccineum/roseum - biskupsbrá	Fjölæringur skyldur Baldursbrá, rauðfjólublá.
1050	Telekia - Garðageisli	Hávaxinn, glæsileg planta sem þarf gott skjól og uppbindingu. Sáð sem fyrst, gjarnan við 15-20°C, ef spírun er léleg er hægt að setja pottinn í vermireit yfir veturinn. . .
0654	Tellima grandiflora - Kögurkolla	Fjölæringur, harðger. Blóm gulgræn og síðar rauðleit í júní-júlí. Hæð 40-70 cm. Þrífst best í hálfskugga/skugga og næringarríkum jarðvegi. Sáir sér talsvert.
0844	Teucrium chamaedrys - Hertogadraumur	Varasöm planta. Skyldari runna en blómum. Blóm þessarar plöntu hafa verið notuð í te, jurtahykki og heilsudrykki. Heilsubúðir (erlendis) hafa auglýst þessar afurðir úr germander sem skaðlaus megrunaraðferð. Vafi talinn leika á sakleysi plöntunnar.
0735	Thalictrum alpinum - Brjóstagras	Fjölæringur, harðger. Blóm lítil fjólublá í maí - júní. Hæð 5 - 20 cm. Kjörlendi holt, hlíðar og grasbalar.
0318	Thermopsis lanceolata - Lensugandur	Fjölæringur, meðalharðger. Blóm fölpurpura eða hvít í júlí - ágúst. Hæð 90-120 cm., þarf stuðning. Þrífst best í sól og rökum frjóum jarðvegi.



0982	Thuja koraiensis - Kóreulífiður	Tré eða runni.
1060	Tithonia	Hávaxið sumarblóm sem þrífst best á sólríkum stað í vel framræstri jörð.
0705	Tofieldia pusilla – Síkisgras	Íslensk smájurt 5-10cm há, sígænt lauf, gulhvít blóm í axi. EITRUÐ JURT. Vex í móum og holtaborðum um land allt.
0321	Tofieldia pusilla* - Síkisgras eða Bjarnabroddur	Íslensk smájurt 5-10cm há, sígænt lauf, gulhvít blóm í axi. EITRUÐ JURT. Vex í móum og holtaborðum um land allt.
0845	Townsendia rothrockii - Kögursólbikar	Fjölæringur. Hæð allt að 10 cm. Blóm hvít eða fölblaik. Þarf gott frárænnsli. Lítið reynd planta.
0322	Triglochin maritima* - Strandsauðlaukur *	Fjölæringur, harðger. Hæð 15-40 cm. Blóm lítil fölblaik í júní. Þrífst best í sendnum jarðvegi.
0701	Triglochin palustris - Mýrasauðlaukur	Fjölæringur, harðger. Hæð 15-25 cm. Blóm fölblaik/ljósflóublá í júní. Þrífst í rökum sendnum jarðvegi.
0323	Trillium grandiflorum - Skógarþristur	Fjölær jurt frá Norður-Ameríku, 30-40cm há, blöð lensulaga þrískipt í hvirfli utan um stöngul, blóm hvít - þrjú krónublöð. Skógarbotnsjurt sem þarf að fá að vaxa í graslausum, kalkfríum skógarbotni, dreifir sér með jarðstönglum og þarf nokkur ár til að setjast að og ná sér á strik. Afar fallegur vorboði í skógargarðinum. in er best að láta liggja í vatni fyrsta sólarhringinn og sá svo í pott í skjóli, í skugga, þar sem moldin getur haldist rök. Strá 2-3cm af mold yfir in. Þrista þurfa oftast flókin skipti af heitu og köldu í mislangan tíma, í rökum jarðvegi til að spíra. Spírun er því oftast að vori, ári eftir sáningu, jafnvel 2.. Nánar má lesa um þrista hér: https://gardurinn.is/blom-vikunnar-med-gurry-trillium-thristar/
0719	Trillium kurabayashii - Þristategund án íslensks heitis	Fjölær jurt. 30-40cm. Best í hálfskugga í djúpu, rökum en framræstum, frjóum, húmusríkum jarðvegi. Tilvalin í skógarbotn. Blómstrar djúpvínrauðu að vori eða snemma sumars. Laufin aðeins mynstruð.. Þristar taka sér oft dágóðan tíma til að koma sér vel fyrir og eru því plöntur fyrir þolinmóða. Frá sáningu geta liðið nokkuð mörg ár áður en plantan er sátt og byrjar að blómstra.. in er best að láta liggja í vatni fyrsta sólarhringinn og sá svo í pott í skjóli, í skugga, þar sem moldin getur haldist rök. Strá 2-3cm af mold yfir in. Þrista þurfa oftast flókin skipti af heitu og köldu í mislangan tíma, í rökum jarðvegi til að spíra. Spírun er því oftast að vori, ári eftir sáningu, jafnvel 2.. Nánar má lesa um þrista hér: https://gardurinn.is/blom-vikunnar-med-gurry-trillium-thristar/
0718	Trillium sessile - Doppuþristur	Fjölær jurt. 15-30cm. Best í hálfskugga í djúpu, rökum en framræstum, frjóum, húmusríkum jarðvegi. Tilvalin í skógarbotn. Blómstrar djúpvínrauðu að vori eða snemma sumars. Laufin aðeins mynstruð.. Þristar taka sér oft dágóðan tíma til að koma sér vel fyrir og eru því plöntur fyrir þolinmóða. Frá sáningu geta liðið nokkuð mörg ár áður en plantan er sátt og byrjar að blómstra.. in er best að láta liggja í vatni fyrsta sólarhringinn og sá svo í pott í skjóli, í skugga, þar sem moldin getur haldist rök. Strá 2-3cm af mold yfir in. Þrista þurfa oftast flókin skipti af heitu og köldu í mislangan tíma, í rökum jarðvegi til að spíra. Spírun er því oftast að vori, ári eftir sáningu, jafnvel 2.. Nánar má lesa um þrista hér: https://gardurinn.is/blom-vikunnar-med-gurry-trillium-thristar/
0326	Trollius cultorum - Garðagullhnappur	Fjölær jurt, allt að 60 cm há, handskipt blöð, stór gul blóm í júní. Blendingstegund sem þroskar árlega. Afkomendurnir geta verið misjafnir. Sá þarf junum og hafa í kulda í a.m.k. 8 vikur áður en hægt er að fá þau til að spíra við venjulegar aðstæður.



0584	Trollius cultorum 'Orange' - Garðagullhnappur 'Orange'	Garðagullhnappur - fjölær blendingstegund - 50-60cm - júní - gul eða órans - sáð við 18-20°C í 4 vikur, svo kælt niður í 0°C í 4 vikur, svo aftur í 5-12°C. Einnig beint í reit úti að hausti.
0983	Trollius mixed - Gullhnappur, mix	Blandaðir gullhnappar.
0707	Tropaeolum peregrinum - Dvergflétta	Sumarblóm. Klifurplanta. Blómstrar gulu. Ef sáð er inni í mars, blómstrar hún við góðar aðstæður megnið af sumrinu. Þarf sól og gott skjól. Getur náð 4metra hæð og þarf eitthvað til að halda sér í/klifra. Venjuleg garðmold dugar fínt.
0807	Tulipa turkestanica - Dalatúlipani	Fjölær laukplanta. Hæð 15-30 cm. Blómstrar hvítum blómum með gulri miðju í apríl-júní. Þrífst í léttum vel framræstum sendnum jarðvegi nokkuð frjóum. Nokkuð harðgerður. Liljuætt/Liliaceae
0849	Vaccinium myrtillus* - Aðalbláberjalyng/Aðalbláber*	Íslensk fjölær planta. Hæð 20-30 cm. Blómgast frá miðjum maí-júní. Blá ber í ágúst-september. Stundum svört bert kallast þá Aðalber. Þrífst best þar sem það hefur vetrarskýlingu af snjó eða öðrum gróðri.
0890	Verbascum bombyciferum 'Arctic Summer' - Án ísl. heitis	Tvíær. Fyrsta árið blaðvöxtur, seinna árið blómstöngull. Örugast að skýla yfir veturinn. Kís sólríkan, þurran stað. Best ef forræktuð inni áður en sett er út í garð. Yfirborðssáning við stofuhita. Blómstöngull og blöð eru loðin, ekki ósvipað lambseyra, blómlitur gulur. 150-180cm
0914	Veronica prostrata - Dvergdepla	Fjölær. Ljósblá blóm, hæð allt að 20 cm. Blómstar í júní-júlí. Þrífst í sól eða hálfskugga og í léttum vel framræstum sandblönduðum jarðvegi sem er frekar rýr.
0891	Viburnum alnifolium/lantanoides - Elgsrunni	Blaðfallegur, blómstrandi runni. Blómstrar snemmsumars hvítum til ljósbleikum sveipum sem minna á smærri útgáfu af hortensíu blómum. Myndar æt rauð ber, sem verða svo svört þegar eru fullþroska. Fallegir rauðir haustlitir. Kís næringarríkan, rakan jarðveg. Nær 2-3metra hæð. Látið ið liggja í vatni í ca 24klst. Hægt er að sá út að hausti, en getur þá tekið 2ár að spíra. Betur gefst að setja í lítinn plastpoka ásamt smávegis af rakri, hreinni pottamold og/eða fíngerðum vikri. Geyma pokann við stofuhita í ca 5 mánuði og fylgjast með honum inn á milli, til að grípa in ef þau hafa byrjað að spíra og til að fjarlægja myglu ef einhver slík kemur upp. Eftir þetta er hægt að sá junum í pott á miðjum vetri og setja út, eða setja pokann inn í kæli í ca 2,5-3mánuði og sá að þeirri meðhöndlun lokinni. Við sáningu er heppilegt að hylja ið með ca 5-6mm af mold.
0335	Viburnum edule - Bersarunni	Lauffellandi runni úr skógum Norður-Ameríku. 2,5m hár og getur orðið jafn á breiddina, lauf þríflipuð líkt og á hlyni, blómin í klösum fölbleik, rauð ber að hausti, berin æt og af þeim leggur lykt sem fólk er ekki sammála um hvort þeim þyki góð eða vond. En úr þeim má gera afbragðs góðar sultur og hlaup. Góð viðbót við trjágróður skjólbelta og sumarbústaðalandsins. Þarf sama atlæti og aðstöðu og ilmreynir. Fyllilega harðger, lokkar að fugla og hefur fallega haustliti.
0337	Viburnum glomeratum - Geislaber	Lauffellandi runni frá fjallendinu milli Kína og Myanmar. Hæð 1-3m, blöðin egglega, djúpæðött og smátennt. Blómhnappar bleikir en blómin hvít í klösum. Rauð ber að hausti.
0341	Vicia sepium* - Giljaflækja*	Fremur sjaldgæf jurtt, íslensk, vex nær eingöngu á Suðurlandi, einkum undir Eyjafjöllum og í Mýrdal. Líkist umfeðmingi.
1012	Viola adunca -	Fjölær. Blá blóm. Hæð 7-15 cm. Sól eða hálfskuggi. Rakaheldinn vel framræstur jarðvegur, þolir einhvern þurrk. Fjóra frá Norður-Ameríku.
0985	Viola cornuta (Viola x williamsii) - Fjóra	Sumarblóm. í forsáð inni í febrúar.
0892	Yucca baccata	Frostþolin yucca. Þegar hún er orðin sæmilega stór og sterk og búin að koma sér fyrir er þessi sögð þola 15stiga frost, en



		jafnvel niður í 25stiga frost. Lykilatriði þar er þó að hún sé alveg varin frá vetrarvætu, sé staðsett þannig að væta renni öll frá henni og safnist ekki fyrir, auk þess að vera í sérlega vel drenandi jarðvegi á sólríkum stað. Sáð grunnt.
0894	Zinnia Elegans 'Early Wonder' - Drottningarfífill	Einær/sumarblóm. Forsáð inni við stofuhita í mars. Sáð mjög grunnt, ca 3mm. Hæð: 30-100cm. Best í góðri sól á heitum stað, í skjóli frá vindum og rigningu. Ýmsir litir.
0896	Zinnia Elegans 'Queen Red Lime' - Drottningarfífill	Einær/sumarblóm. Forsáð inni við stofuhita í mars. Sáð mjög grunnt, ca 3mm. Hæð: ca 60cm. Best í góðri sól á heitum stað, í skjóli frá vindum og rigningu. Rauðleit með limegrænum tónum.
0897	Zinnia haageana 'Aztec Sunset' - Drottningarfífill	Einær/sumarblóm. Forsáð inni við stofuhita í mars. Sáð mjög grunnt, ca 3mm. Hæð: 20-30cm. Best í góðri sól og skjóli frá vindum og rigningu.